



## FICHA TÉCNICA

### Parenteril Inyectable

#### SECCIÓN 1: información del producto

**Nombre Comercial del Producto:** PARENTERIL INYECTABLE

**Clasificación farmacológica:** Antibióticos – Quimioterápicos clásicos y combinados.

**Forma Farmacéutica:** Solución inyectable.

**Especies indicadas:** Bovinos.

**Vías de administración:** Intramuscular o endovenosa lenta.

#### SECCIÓN 2: Composición

<i>Componente</i>	<i>Cantidad</i>
Espiramicina Adipato	5,5 g
Gentamicina Sulfato	7,2 g
Flunixin Meglumina	2,5 g
Excipientes c.s.p.	100 ml

#### SECCION 3: Indicaciones

Parenteril inyectable está indicado para el tratamiento de infecciones de etiología bacteriana producidas por gérmenes sensibles a la espiramicina y/o gentamicina en Bovinos, por ejemplo: Mastitis agudas y crónicas, endometritis y metritis, pietín, lesiones dérmicas, neumonías de distinta etiología, queratoconjuntivitis, gastroenteritis, onfaloflebitis, poliartritis, preventivo de infecciones post operatorias en cirugía mayor o menor. Afecciones de cavidad bucal y faríngea. Parenteril inyectable aporta a la acción antimicrobiana de Espiramicina y Gentamicina, la actividad antiinflamatoria, analgésica y antipirética de Flunixin meglumina. La actividad combinada de los tres principios activos favorece un rápido y efectivo control de los cuadros infecciosos, a la vez que se reducen la inflamación, dolor e hipertermia asociados.

Camila O'Gorman 412, Piso 12°

Puerto Madero - C1107DED

Buenos Aires - Argentina

Tel: (54 11) 3724 7700

[info.argentina@ceva.com](mailto:info.argentina@ceva.com)

*Juntos, más allá de la Salud Animal*



## FICHA TÉCNICA

### Parenteril Inyectable

#### SECCION 4: Precauciones y advertencias – Contraindicaciones – Restricciones de uso

**CONTRAINDICACIONES DE USO:** No administrar en animales previamente reconocidos como hipersensibles a alguno de los principios activos y/o excipientes del producto.

No usar en casos de daño renal o hepáticos severos, hipotensión, deshidratación, insuficiencia cardiaca ni en animales con lesiones de mucosa gastrointestinal.

No utilizar juntamente con fármacos potencialmente nefrotóxicos: bloqueantes neuromusculares, diuréticos, Cefalotina, Cefaloridina, Anfotericina B o Heparina. La inyección intraarterial debe ser evitada (ya que produce ataxia, incoordinación, hiperventilación y debilidad muscular).

**PRECAUCIONES DE USO:** Luego de administrar por primera vez el producto a un animal, controlar la aparición de síntomas de reacción alérgica. En caso positivo tratar sintomáticamente.

Verificar que el sistema de inviolabilidad del producto y sus condiciones de almacenamiento previo a su uso sean las adecuadas, así como que el mismo no haya caducado en referencia a la fecha de vencimiento expresada en el rótulo.

La inyección Intramuscular puede provocar dolor y/o induración pasajeros. La inyección endovenosa debe realizarse en forma lenta.

**RESTRICCIONES DE USO:** Tiempo de retiro pre- faena: 25 días. Tiempo de retiro en leche: 96 horas.

#### SECCION 5: Especificaciones del producto

**Color:** Amarillo.

**Aspecto:** Solución límpida y cristalina.

#### SECCION 6: Presentaciones

Camila O'Gorman 412, Piso 12°

Puerto Madero - C1107DED

Buenos Aires - Argentina

Tel: (54 11) 3724 7700

[info.argentina@ceva.com](mailto:info.argentina@ceva.com)

*Juntos, más allá de la Salud Animal*



## FICHA TÉCNICA

### Parenteril Inyectable

Frasco ampolla multidosis: 25, 50, 100, 250 ml.

#### SECCION 7: Periodo de validez

2 años a partir de la fecha de elaboración.

#### SECCION 8: Dosis y aplicación

1 ml cada 12 kg de peso cada 24 hs por vía intramuscular o intravenosa lenta. Esto es equivalente aproximadamente a 18.400 Ul /kg de peso vivo de espiramicina adipato, 6,0 mg/ kg de peso vivo de gentamicina sulfato y 2,1 mg/kg de flunixin meglumina. Se recomienda un mínimo de dos dosis. La duración del tratamiento dependerá de la evolución del cuadro clínico y del criterio del profesional Veterinario.

#### SECCION 9: Conservación

Entre 15°C y 30°C, al resguardo de la luz solar directa.

#### SECCION 10: Información adicional

- SENASA N° Cert. 20-061
- Titular de la autorización: Productos Veterinarios S.A., Ruta 168 Paraje El Pozo – PTLC, Santa Fe – Argentina.
- Uso en medicina veterinaria.
- Mantener fuera del alcance de los niños y animales domésticos.
- Los envases utilizados deberán ser descartados de acuerdo con la legislación local vigente.
- El uso de este producto sin un diagnóstico correcto puede generar resistencia a los antimicrobianos. Se deberá respetar la dosis, intervalo y duración del tratamiento.
- Centro Nacional de Intoxicaciones en Argentina: 0800 333 0160.

Camila O'Gorman 412, Piso 12°

Puerto Madero - C1107DED

Buenos Aires - Argentina

Tel: (54 11) 3724 7700

[info.argentina@ceva.com](mailto:info.argentina@ceva.com)

*Juntos, más allá de la Salud Animal*