



FICHA TÉCNICA

Prexican

SECCIÓN 1: información del producto

Nombre Comercial del Producto: PREXICAN.

Clasificación farmacológica: Antibióticos – Quimioterápicos clásicos y combinados.

Forma Farmacéutica: Suspensión inyectable.

Especies indicadas: Bovinos, equinos, ovinos, porcinos, caninos y felinos.

Vías de administración: Intramuscular profunda.

SECCIÓN 2: Composición

<i>Componente</i>	<i>Cantidad</i>
Penicilina G procaínica	20.000.000 UI (20 g)
Estreptomicina	8 g
Piroxicam	0,6 g
Excipientes c.s.p.	100 ml

SECCION 3: Indicaciones

Se trata de una formulación antimicrobiana de amplio espectro destinada a combatir infecciones mixtas causadas por bacterias gram positivas, aerobias y anaerobias, y gram negativas. Además, cuenta con el accionar de un potente agente antiinflamatorio y analgésico. Presenta efectividad en el control de afecciones causadas por las siguientes bacterias: Streptococcus penicilina - lábiles; Staphylococcus penicilina - lábiles; Corynebacterium pyogenes; Clostridium spp.; Erysipelothrix rhusiopathie; Actinomyces ovis; Leptospira spp; Pasteurella spp.; Escherichia coli y Campylobacter foetus.

SECCION 4: Precauciones y advertencias – Contraindicaciones – Restricciones de uso

Camila O'Gorman 412, Piso 12°

Puerto Madero - C1107DED

Buenos Aires - Argentina

Tel: (54 11) 3724 7700

info.argentina@ceva.com

Juntos, más allá de la Salud Animal



FICHA TÉCNICA

Prexican

CONTRAINDICACIONES, PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS: Evite administrar en animales con historia de reacciones alérgicas o hipersensibilidad a los principios activos del producto.

No administrar a animales con insuficiencia renal, insuficiencia hepática o úlceras gastrointestinales.

Agitar el frasco antes de su uso.

Utilizar jeringa y aguja estériles.

Cerciórese al introducir la aguja y previo al inyectar el antibiótico, que la misma no esté en un vaso sanguíneo.

El producto no presenta efectos adversos en hembras gestantes ni en cachorros. En el caso particular de los felinos, la estreptomicina puede provocar náuseas, vómito, salivación y ataxia. Este efecto puede presentarse a las dosis terapéuticas. En el perro y en el gato, la estreptomicina puede causar lesiones vestibulares irreversibles, produciendo ataxia locomotriz que progresa hacia la incoordinación de movimientos, nistagmus, pérdida de los reflejos e incluso muerte. La intensidad de estos efectos indeseables depende de la dosis administrada. En el gato, la administración diaria por vía IM de dosis 5 a 10 veces superiores a las recomendadas producen este efecto en el plazo de 10 días. A la dosis recomendada es bien tolerado. Las reacciones colaterales que pueden presentarse están relacionadas con el tracto gastrointestinal y pueden ser estomatitis, anorexia, constipación o diarrea y dispepsia.

RESTRICCIONES DE USO: No destinar animales a faena para consumo humano hasta 30 días después de finalizado el tratamiento. No aplicar en equinos destinados a consumo humano. No destinar a hembras gestantes. Tiempo de restricción en leche: 72 horas. Se adjunta un listado de Centros Toxicológicos, a los efectos de asesoramiento médico en caso de intoxicación accidental en humanos.

Camila O'Gorman 412, Piso 12°

Puerto Madero - C1107DED

Buenos Aires - Argentina

Tel: (54 11) 3724 7700

info.argentina@ceva.com

Juntos, más allá de la Salud Animal



FICHA TÉCNICA

Prexican

SECCION 5: Especificaciones del producto

Color: Blanco a ligeramente amarillento.

Aspecto: Suspensión homogénea.

SECCION 6: Presentaciones

25 ml, 50 ml y 100 ml.

SECCION 7: Periodo de validez

2 años a partir de la fecha de elaboración.

SECCION 8: Dosis y aplicación

Se administra a razón de 1 ml cada 20 kg de peso vivo. El tratamiento debe repetirse a las 24 horas. Se recomienda prolongar el tratamiento durante 3 días de acuerdo con la evolución de los signos clínicos y al criterio del profesional actuante. De no remitir los signos replantear el diagnóstico y su tratamiento.

SECCION 9: Conservación

Conservar entre 15°C y 30°C y al abrigo de la luz solar directa.

SECCION 10: Información adicional

- SENASA N° Cert. 04-005
- Titular de la autorización: Productos Veterinarios S.A., Ruta 168 Paraje El Pozo – PTLC, Santa Fe – Argentina.
- Uso en medicina veterinaria.
- Mantener fuera del alcance de los niños y animales domésticos.

Camila O'Gorman 412, Piso 12°

Puerto Madero - C1107DED

Buenos Aires - Argentina

Tel: (54 11) 3724 7700

info.argentina@ceva.com

Juntos, más allá de la Salud Animal



FICHA TÉCNICA

Prexican

- Los envases utilizados deberán ser descartados de acuerdo con la legislación local vigente.
- Centro Nacional de Intoxicaciones en Argentina: 0800 333 0160.

Camila O'Gorman 412, Piso 12°

Puerto Madero - C1107DED

Buenos Aires - Argentina

Tel: (54 11) 3724 7700

info.argentina@ceva.com

Juntos, más allá de la Salud Animal