



## FICHA TÉCNICA

### Tilmicofull

#### SECCIÓN 1: información del producto

**Nombre Comercial del Producto:** TILMICOFULL.

**Clasificación farmacológica:** Antibiótico, Quimioterápicos clásicos y combinados.

**Forma Farmacéutica:** Solución.

**Especies indicadas:** Bovinos.

**Vías de administración:** Oftálmica.

#### SECCIÓN 2: Composición

<i>Componente</i>	<i>Cantidad</i>
Tilmicosina base	2,5 g
Flunixin meglumina	0,2 g
Lidocaina HCL	0,1 g
Violeta de genciana	0,0064 g
Vehículo c.s.p.	100 ml

#### SECCION 3: Indicaciones

Tratamiento de la queratoconjuntivitis infecciosa en bovinos. Además, el producto combina otros agentes coadyuvantes en la resolución de estas patologías: Flunixin meglumine: Antiinflamatorio no esteroide. Lidocaína clorhidrato: Anestésico local. Violeta de genciana: Principio activo con acción antiséptica.

#### SECCION 4: Precauciones y advertencias – Contraindicaciones – Restricciones de uso

**PRECAUCIONES DE USO:** Utilizar guantes de látex para su administración. Verificar que el sistema de inviolabilidad del producto y sus condiciones de almacenamiento previo a su uso sean las adecuadas, así como que el mismo no haya caducado en referencia a la fecha de vencimiento expresada en el rótulo.

Camila O'Gorman 412, Piso 12°

Puerto Madero - C1107DED

Buenos Aires - Argentina

Tel: (54 11) 3724 7700

[info.argentina@ceva.com](mailto:info.argentina@ceva.com)

*Juntos, más allá de la Salud Animal*



## FICHA TÉCNICA

### Tilmicofull

**RESTRICCIONES DE USO:** No requiere tiempo de retiro pre-faena ni pre-ordeño.

**ATENCIÓN:** En caso de ingestión accidental tratar sintomáticamente, no existe antídoto específico. Tratar de inducir el vómito y LLAMAR URGENTEMENTE AL MEDICO.

#### SECCION 5: Especificaciones del producto

**Color:** Violeta.

**Aspecto:** Solución límpida y cristalina.

#### SECCION 6: Presentaciones

10, 15, 100, 200 ml.

#### SECCION 7: Periodo de validez

2 años a partir de la fecha de elaboración.

#### SECCION 8: Dosis y aplicación

**Aplicación oftálmica:** Se debe bajar el párpado inferior del paciente y realizar 1 a 3 descargas o aspersiones (0,3 ml cada una aproximadamente) en cada ojo a una distancia aproximada de 20 cm. Una vez administrado el medicamento, dejar libre de nuevo el párpado del paciente. El parpadeo facilita la distribución del medicamento por toda la superficie ocular.

**Intervalo entre dosis:** 12 horas. **Duración del tratamiento:** Se recomienda un mínimo de 4 días continuados de tratamiento. La posterior continuación del mismo dependerá del criterio del profesional Veterinario actuante.

#### SECCION 9: Conservación

Conservar al resguardo de la luz solar directa, entre 15°C y 30°C.

Camila O'Gorman 412, Piso 12°

Puerto Madero - C1107DED

Buenos Aires - Argentina

Tel: (54 11) 3724 7700

[info.argentina@ceva.com](mailto:info.argentina@ceva.com)

*Juntos, más allá de la Salud Animal*



### SECCION 10: Información adicional

- SENASA N° Cert. 13-117
- Titular de la autorización: Productos Veterinarios S.A., Ruta 168 Paraje El Pozo – PTLC, Santa Fe – Argentina.
- Uso en medicina veterinaria.
- Mantener fuera del alcance de los niños y animales domésticos.
- Los envases utilizados deberán ser descartados de acuerdo con la legislación local vigente.
- El uso de este producto sin un diagnóstico correcto puede generar resistencia a los antimicrobianos. Se deberá respetar la dosis, intervalo y duración del tratamiento.
- Centro Nacional de Intoxicaciones en Argentina: 0800 333 0160.

**Camila O'Gorman 412, Piso 12°**

Puerto Madero - C1107DED

Buenos Aires - Argentina

Tel: (54 11) 3724 7700

[info.argentina@ceva.com](mailto:info.argentina@ceva.com)

*Juntos, más allá de la Salud Animal*