



FICHA TÉCNICA

Vermex Inyectable

SECCIÓN 1: información del producto

Nombre Comercial del Producto: VERMEX INYECTABLE.

Clasificación farmacológica: Antiparasitario interno.

Forma Farmacéutica: Solución inyectable.

Especies indicadas: Bovinos.

Vías de administración: Subcutánea.

SECCIÓN 2: Composición

Componente	Cantidad
Cada 100 ml contiene	
Ricobendazol	15 g
Vehículo c.s.p	100 ml

SECCION 3: Indicaciones

Antiparasitario nematocida para bovinos indicado para el tratamiento de parasitosis producidas por especies de: Dictyocaulus spp., Haemonchus spp., Ostertagia spp., Trichostrongylus spp., Cooperia spp., Nematodirus spp., Bunostomum spp., Chabertia spp., Oesophagostomum spp., Stongyloides spp., y Trichuris spp.

SECCION 4: Precauciones y advertencias – Contraindicaciones – Restricciones de uso

No utilizar hasta 45 días después de haber retirado los reproductores.

No administrar en animales hipersensibles a alguno de los principios activos y/o excipientes del producto.

No inyectar más de 10 ml en el punto de inyección.

No destinar animales a faena para consumo humano hasta 28 días después de finalizado el tratamiento.

Camila O'Gorman 412, Piso 12º

Puerto Madero - C1107DED

Buenos Aires - Argentina

Tel: (54 11) 3724 7700

info.argentina@ceva.com

Juntos, más allá de la Salud Animal



FICHA TÉCNICA

Vermex Inyectable

No destinar la leche de los mismos a consumo humano hasta 72 horas después de finalizado el tratamiento.

No administrar a hembras los primeros 45 días de preñez.

ATENCIÓN: En caso de ingestión accidental pueden presentarse síntomas de tipo gastrointestinal, incluyendo náuseas, vómitos, anorexia y diarrea. El tratamiento es sintomático, no existe antídoto específico.

No exceder las dosis propuestas.

Verificar que el sistema de inviolabilidad del producto y sus condiciones de almacenamiento previo a su uso sean las adecuadas, así como que el mismo no haya caducado en referencia a la fecha de vencimiento expresada en el rótulo.

SECCION 5: Especificaciones del producto

Color: Incoloro a levemente anaranjado.

Aspecto: Solución límpida y cristalina.

SECCION 6: Presentaciones

100, 500 y 1000 mL.

SECCION 7: Periodo de validez

2 años a partir de la fecha de elaboración.

SECCION 8: Dosis y aplicación

Dosis única de 3,75 mg /kg de peso (1 ml de producto cada 40 kg de peso). Para Ostertagia la dosis a utilizar es de 7,5 mg/kg de peso (1 ml de producto cada 20 kg de peso).

SE RECOMIENDA UN AYUNO DE 12 A 24 HORAS PREVIO AL TRATAMIENTO.

Camila O'Gorman 412, Piso 12º

Puerto Madero - C1107DED

Buenos Aires - Argentina

Tel: (54 11) 3724 7700

info.argentina@ceva.com

Juntos, más allá de la Salud Animal



FICHA TÉCNICA

Vermex Inyectable

SECCION 9: Conservación

Entre 15°C y 30°C, al resguardo de la luz solar directa.

SECCION 10: Información adicional

- SENASA N° Cert. 03-231
- Titular de la autorización: Productos Veterinarios S.A., Ruta 168 Paraje El Pozo – PTLC, Santa Fe – Argentina.
- Uso en medicina veterinaria.
- Mantener fuera del alcance de los niños y animales domésticos.
- Los envases utilizados deberán ser descartados de acuerdo con la legislación local vigente.
- Centro Nacional de Intoxicaciones en Argentina: 0800 333 0160.

Camila O'Gorman 412, Piso 12º

Puerto Madero - C1107DED

Buenos Aires - Argentina

Tel: (54 11) 3724 7700

info.argentina@ceva.com

Juntos, más allá de la Salud Animal