velactis®

El primer y único facilitador de secado inteligente



- *Una dosis única de 5 mL de cabergolina (1,12 mg/mL).*
- *Optimiza el manejo durante el secado sin alterar la alimentación y frecuencia de ordeño.*
- *Reduce la presión intramamaria y el goteo, favoreciendo la formación del tapón de queratina.*
- *Mejora la salud de la ubre y el bienestar de tus vacas en el momento del secado.*
- *Más días de ordeño, más litros de leche, mayor rentabilidad.*

ceva

Velactis®
El primer y único facilitador de secado inteligente

- *Velactis® contiene cabergolina (1,12 mg/mL).*
- *Se administra por vía intramuscular en una única dosis de 5 mL, inmediatamente después del último ordeño.*
- *Reduce la producción de leche y, en consecuencia, la presión intramamaria y el goteo, facilitando el secado.*
- *Mejora la salud de ubre y el bienestar de la vaca lechera.*
- *Incremento de la producción de leche en el primer tercio de la lactancia.*[1]
- *Tiempo de retiro en leche: 0 días*.*



Disponible en dosis individuales.



HACÉ CLICK AQUÍ

y conocé más sobre Velactis®

[1] Souza et al. (2026)

* En períodos de secado de más de 32 días. En caso de menos de 32 días se deberá contemplar 4 días de retiro.

El secado

Aquí es donde todo comienza. El secado es el comienzo de la próxima lactancia.


OBJETIVOS

- *Inducir una correcta involución y regeneración de la glándula mamaria, para garantizar la futura lactancia.*
- *Cuidar de la salud de ubre al eliminar y prevenir infecciones intramamarias.*
- *Mejorar el bienestar animal.*

SECADO PAULATINO	SECADO ABRUPTO	ABRUPTO + VELACTIS®
✘ *Mayor demanda de mano de obra*	✘ *Mayor presión intramamaria*	✔ *Menor presión intramamaria*
✘ *Manejo más complejo*	✘ *Mayor goteo de leche*	✔ *Menor goteo de leche*
✘ *Menor volumen de leche comercializable*	✘ *Menor bienestar animal*	✔ *Mayor bienestar animal*
✘ *Mayor incidencia de infecciones intramamarias ambientales al parto*[1]		✔ *Sin pérdida de leche comercializable*
✘ *Tendencia a mayor descarte de vaquillonas*[1]		✔ *Manejo simple y práctico*

MAYOR INCIDENCIA DE IMI AMBIENTALES AL PARTO

Vacas multíparas



El secado paulatino se asoció con una mayor incidencia de infecciones intramamarias ambientales al parto en vacas multíparas.

11% vs 5% (P = 0,04)

IMI ambientales: Streptococcus spp., Streptococcus dysgalactiae, Enterococcus spp. y Enterobacter spp.
Adaptado de: Gott et al. Reduced Milking Frequency Before Dry-Off. Journal Dairy Science 2026.

Dato destacado

Las pérdidas por goteo después del secado pueden afectar a más del 20% de las vacas del tambo.[2]
El goteo de leche puede incrementar hasta cuatro veces las infecciones intramamarias.[3]



[1] Gao et al. 2026. En vaquillonas, el secado paulatino presentó una tendencia a mayor descarte respecto del secado abrupto (19,9% vs. 13,7%; P = 0,09), es decir +45%
En vacas multíparas aumentó la incidencia de infecciones intramamarias porbacterias ambientales al parto
[2] Datos de campo de Estados Unidos, Brasil, México y Europa
[3] Schukken et al. (1993)

Comparación de los tratamientos de secado

Vacas control (sin tratamiento con Velactis)

VACA CONTROL N.° 1


Antes del último ordeño


Después del último ordeño


+ 1 día


+ 2día

VACA CONTROL N.° 2


Antes del último ordeño


Después del último ordeño


+ 1 día


+ 2día

La leche se acumula en la ubre tras el secado

Vacas tratadas con Velactis después del último ordeño

VACA TRATADA N.° 1


Antes del último ordeño


Después del último ordeño


+ 1 día


+ 2día

VACA TRATADA N.° 2


Antes del último ordeño


Después del último ordeño


+ 1 día


+ 2día

Las vacas tratadas con Velactis® no acumulan leche en la ubre y la glándula mamaria involuciona rápidamente

¿Cómo usar Velactis®?

Antes

PREPARACIÓN PARA EL SECADO (PASOS 1-3)

1. Listado e identificación
- ✔ Prepará el listado de secado.
- ✔ Verificá los RP y marcá los animales seleccionados.

2. Último ordeño
El día del secado, realizá el último ordeño y suspendé el ordeño de forma abrupta.

3. Materiales listos
Prepará las jeringas intramamarias y selladores indicados, toallitas, guantes, jeringa, pintura y planilla.

Durante

PROCEDIMIENTO EL DÍA DEL SECADO (PASOS 4-6)

4. Higiene estricta
- ✔ Desinfectá los pezones, especialmente sus extremos.
- ✔ Usá guantes y material individual limpio.

5. Terapia intramamaria
Aplicá antibiótico y/o sellador según indicación, con técnica aséptica.
No masajeés el sellador.

6. Aplicar Velactis®
- ✔ Administración: dosis única de 5 mL, vía intramuscular (IM) inmediatamente después del último ordeño.
- ✔ Confirmá el marcado de la vaca.

Después

REGISTRO Y CUIDADOS POSTERIORES (PASOS 7-8)

7. Registrar el secado
Anotá RP, fecha, tratamientos, lote del producto y responsable.

8. Monitoreo
- ✔ Evitar que la vaca se eche post aplicación de Velactis® por al menos 1 hora, estimulando con alimentación.
- ✔ Seguí durante los próximos días la salud de ubre y el estado general.

Puntos críticos




- ✔ ***Higiene rigurosa en cada pezón.***
- ✔ ***Sin restricción alimentaria previa.***
- ✔ ***Agua siempre disponible.***
- ✔ ***No omitir controles post-secado.***
- ✔ ***Administrar en animales que tengan un buen estado sanitario, nutricional y balance mineral.***
- ✔ ***Realizar terapia de secado habitual con jeringa intramamaria antibiótico y/o sellador interno en caso de utilizar.***

Con Velactis® ahora no es necesario reducir la producción diaria de leche previo al secado – del último ordeñe al secado, sin pasos intermedios.
Secado abrupto, sin necesidad de reducir previamente la producción de leche.

Evidencia de eficacia de Velactis®


*Velactis® reduce la presión intramamaria en un 59% y la congestión mamaria en un 49%**

Reduce la presión intramamaria en un 59 %.[2]



*En comparación con 4 días antes del secado, previo al ordeño
(Evaluación mediante la puntuación UE)


Reduce la congestión mamaria en un 49 %.[2]




En comparación con 4 días antes del secado, antes del ordeño*

Velactis® reduce el goteo después del secado en un 81% y las infecciones intramamarias en un 21% durante el período seco

Reduce las pérdidas de leche después del secado en un 81%.[3]




Reduce las nuevas infecciones intramamarias durante el período seco en un 21 %.[3]




Velactis® reduce el discomfort después del secado y mejora el período de descanso

Reduce el dolor mamario después del secado.[4]



Aumenta el tiempo de descanso durante el primer día después del secado en un 82 % (2 horas y 35 minutos).[4]



Resultados comprobados y avalados por especialistas

- ✔ *Disminución de la presión intramamaria;*
- ✔ *Disminución de pérdida de leche por el goteo;*
- ✔ *Disminución de edema mamario;*
- ✔ *Facilitación de la generación del tapón de queratina;*
- ✔ *Proceso de secado rápido y confortable;*
- ✔ *Menor recuento de células somáticas en el postparto; reduciendo la mastitis subclínica sin afectar la salud general o fertilidad del rodeo;*
- ✔ *Reducción de la incidencia de mastitis clínica.*

Mayor rentabilidad para tu negocio

- ✔ ***+145 litros de leche en 16 semanas en vacas Holstein;***
- ✔ ***+1.3 litros/día en la próxima lactación en los primeros 112 DEL;***
- ✔ ***Ganancia de hasta 15 DEL al reducir la duración del período seco;***
- ✔ ***ROI estimado entre x5-x9***

velactis®



Cert. Reg. SENASA N° 26.113

Optimizá el manejo del tambo facilitando el secado con Velactis®

#Velactisate

y empezá a comprobar los resultados

HACÉ CLICK AQUÍ

ceva