

INDICAZIONE DEL(I) PRINCIPIO(I) ATTIVO(I) E DEGLI ALTRI INGREDIENTI

Ogni ml contiene:
Principio attivo:
Eprinomectina 5 mg
Eccipienti:
Butilidrossitoluene (E321) 0,10 mg
All-rac- α -tocoferolo (E307) 0,06 mg
Soluzione limpida da giallo chiaro a giallo.

INDICAZIONI

Trattamento di infezioni causate dai seguenti endo- e ectoparassiti sensibili all'eprinomectina.

Bovini: **Ascariidi gastrointestinali, Vermi polmonari:** vedere i dettagli nella tabella alla fine del foglietto illustrativo. **Larve (stadi larvali):** *Hypoderma bovis*, *Hypoderma lineatum*. **Acari della rogn:** *Chorioptes bovis*, *Sarcoptes scabiei* var. *bovis*. **Pidocchi ematofagi:** *Linognathus vituli*, *Haematopinus euryternus*, *Solenopotes capillatus*. **Pidocchi morsiatori:** *Damalinia (Bovicola) bovis*. **Mosche:** *Haematobia irritans*.

Prevenzione delle re-infezioni: Il medicinale veterinario protegge gli animali contro re-infezioni da:

- *Nematodirus helvetianus* per 14 giorni.
 - *Trichostrongylus colubriformis*, *Trichostrongylus axei* e *Haemonchus placei* per 21 giorni.
 - *Dictyocaulus viviparus*, *Cooperia oncophora*, *Cooperia punctata*, *Cooperia surnabada*, *Oesophagostomum radiatum* e *Ostertagia ostertagi* per 28 giorni.
- Per migliori risultati questo medicinale veterinario dovrebbe far parte di un programma per controllare i parassiti dei bovini sia interni che esterni sulla base epidemiologica di questi parassiti.

Pecore: **Ascariidi gastrointestinali (adulti):** *Teladorsagia circumcincta* (pinnata/trifurcata), *Haemonchus contortus*, *Trichostrongylus axei*, *Trichostrongylus colubriformis*, *Nematodirus battus*, *Cooperia curticei*, *Chabertia ovina*, *Oesophagostomum venulosum*. **Verme polmonare (adulto):** *Dictyocaulus filaria*.
Capre: **Ascariidi gastrointestinali (adulti):** *Teladorsagia circumcincta* (pinnata/trifurcata), *Haemonchus contortus*, *Trichostrongylus axei*, *Trichostrongylus colubriformis*, *Nematodirus battus*, *Cooperia curticei*, *Oesophagostomum venulosum*. **Verme polmonare (adulto):** *Dictyocaulus filaria*.

CONTROINDICAZIONI

Questo medicinale veterinario è formulato solo per applicazione topica per bovini, pecore e capre, inclusi animali in lattazione. Non somministrare per via orale o iniettabile. Non usare in altre specie animali. Non usare in casi noti di ipersensibilità al principio attivo o ad uno degli eccipienti.

REAZIONI AVVERSE

In casi molto rari prurito e alopecia sono stati osservati dopo l'impiego del medicinale veterinario.

La frequenza delle reazioni avverse è definita usando le seguenti convenzioni:

- molto comuni (più di 1 su 10 animali trattati manifesta reazioni avverse)
- comuni (più di 1 ma meno di 10 animali su 100 animali trattati)
- non comuni (più di 1 ma meno di 10 animali su 1.000 animali trattati)
- raro (più di 1 ma meno di 10 animali su 10.000 animali trattati)
- molto raro (meno di 1 animale su 10.000 animali trattati, incluse le segnalazioni isolate).

Se dovessero manifestarsi effetti collaterali, anche quelli che non sono già menzionati in questo foglietto illustrativo o si ritiene che il medicinale non abbia funzionato, si prega di informarne il medico veterinario.

SPECIE DI DESTINAZIONE

Bovini (bovini da carne e bovine da latte). Pecore. Capre.

POSOLOGIA PER CIASCUNA SPECIE, VIA E MODALITÀ DI SOMMINISTRAZIONE

Uso pour-on. Solo per singola somministrazione. Per assicurare la somministrazione di una dose corretta, il peso corporeo deve essere determinato nel modo più preciso possibile e l'accuratezza del dosatore deve essere controllata. Se gli animali devono essere trattati collettivamente piuttosto che individualmente, devono essere raggruppati in base al loro peso corporeo e al conseguente dosaggio, al fine di evitare sotto e sovradosaggio. Tutti gli animali appartenenti allo stesso gruppo dovrebbero essere trattati allo stesso tempo.

Metodo di somministrazione:

Per la presentazione da 250 ml: Il flacone è fornito di un dosatore incorporato e ha due aperture. Un'apertura è collegata al flacone e l'altra alla pistola dispensatrice (dosatore). Svitare il tappo anti-manomissione e rimuovere il sigillo della pistola dispensatrice (dosatore incorporato che permette dosaggi da 5 ml e 10 ml). Premere il flacone per riempire il dosatore con il volume del medicinale veterinario richiesto.

Per le presentazioni da 1 litro, 2,5 litri e 5 litri: Da utilizzare con un dosatore appropriato come una pistola dosatrice con tappo di ventilazione accoppiato. Svitare il tappo semplice in polipropilene (PP). Rimuovere il sigillo protettivo dal flacone. Avvitare il tappo di ventilazione al flacone ed assicurarsi che sia ben chiuso. Collegare l'altro lato ad una pistola dosatrice. Seguire le istruzioni del produttore della pistola per regolare il dosaggio e la manutenzione della pistola dosatrice e del tappo di ventilazione. Dopo l'uso i tappi di ventilazione devono essere rimossi e sostituiti da un tappo semplice in PP.

AVVERTENZE PER UNA CORRETTA SOMMINISTRAZIONE

Bovini: Somministrare solo tramite applicazione topica al dosaggio di 0,5 mg di eprinomectina per kg p.c., corrispondente al dosaggio consigliato di 1 ml di medicinale veterinario per 10 kg p.c. Il medicinale veterinario deve essere applicato dal garrese alla base coda, lungo la linea della colonna vertebrale.
Pecore e capre: Somministrare solo tramite applicazione topica al dosaggio di 1,0 mg di eprinomectina per kg p.c., corrispondente al dosaggio consigliato di 2 ml di medicinale veterinario per 10 kg p.c. Quando si somministra il medicinale veterinario lungo la colonna vertebrale, separare la lana/il pelo e posizionare l'ugello dell'applicatore o il dosatore del flacone sulla cute.

TEMPO(I) DI ATTESA

Bovini: Carne e visceri: 15 giorni. Latte: zero ore.

Pecore: Carne e visceri: 2 giorni. Latte: zero ore.

Capre: Carne e visceri: 1 giorno. Latte: zero ore.

PARTICOLARI PRECAUZIONI PER LA CONSERVAZIONE: Tenere fuori dalla vista e dalla portata dei bambini.

Per la presentazione da 250 ml: Tenere il flacone nell'imballaggio esterno per proteggerlo dalla luce.

Per le presentazioni da 1 litro, 2,5 litri, 5 litri: Periodo di validità dopo la prima apertura del contenitore: 6 mesi. Questo medicinale veterinario non richiede alcuna condizione particolare di conservazione. Non usare questo medicinale veterinario dopo la data di scadenza riportata sulla scatola o sull'etichetta dopo "EXP". La data di scadenza si riferisce all'ultimo giorno del mese.

AVVERTENZE SPECIALI

Avvertenze speciali per ciascuna specie di destinazione: Per un impiego efficace, il prodotto non deve essere applicato nelle zone del dorso coperte da fango o letame. Il prodotto deve essere applicato solo su cute sana. Al fine di limitare il trasferimento crociato dell'eprinomectina, gli animali trattati devono essere separati da quelli non trattati. Il non rispetto di questa raccomandazione può condurre a violazioni dei residui in animali non trattati.

In caso di rischio di re-infezione rivolgersi ad un medico veterinario per quanto riguarda la necessità e la frequenza di somministrazione ripetuta. Prestare attenzione nell'evitare le pratiche seguenti perché aumentano il rischio di sviluppo di resistenza e potrebbero in ultimo risultare in una terapia inefficace:

- impiego troppo frequente e ripetuto di antelmintici della stessa classe, per un periodo di tempo troppo lungo.
- sottodosaggio, che può essere dovuto ad una sottostima del peso corporeo, ad una somministrazione errata del medicinale veterinario oppure a perdita della calibrazione del dosatore (se presente).

Casi clinici sospetti di resistenza agli antelmintici dovrebbero essere ulteriormente approfonditi utilizzando test appropriati (ad esempio *Faecal Egg Count Reduction Test* = test di riduzione del conteggio delle uova nelle feci). Nel caso in cui i risultati del(i) test indichino in maniera evidente una resistenza ad un particolare antelmintico, si deve impiegare un antelmintico appartenente ad un'altra classe farmacologica e con diverso meccanismo d'azione. Ad oggi non è stata accertata alcuna resistenza all'eprinomectina (un lattone macrociclico) nei bovini mentre è stata accertata resistenza all'eprinomectina nelle pecore e capre all'interno dell'UE. Tuttavia è stata accertata resistenza ad altri lattoni macrociclici in popolazioni di nematodi in bovini, pecore e capre all'interno dell'UE che può essere associata a resistenza parallela all'eprinomectina. Pertanto l'impiego di questo prodotto dovrebbe basarsi su informazioni epidemiologiche locali (regionali, aziendali) sulla sensibilità di nematodi e raccomandazioni su come limitare l'ulteriore selezione di resistenza agli antelmintici. Mentre il numero di acari e pidocchi diminuisce rapidamente a seguito del trattamento, a causa delle abitudini alimentari di alcuni acari, in alcuni casi possono essere necessarie diverse settimane per l'eradicazione completa.

Precauzioni speciali per l'impiego negli animali: Solo per uso esterno. Il medicinale veterinario deve essere applicato solo su cute sana. Non utilizzare in altre specie; le ivermectine possono causare mortalità in cani soprattutto *Collie*, *Old English Sheepdog* e razze correlate ed incroci ed anche in tartarughe marine e terrestri. La morte delle larve nell'esofago o nel canale vertebrale del midollo spinale può causare reazioni secondarie. Per evitare reazioni secondarie dovute alla morte delle larve di ipodermia nell'esofago o nel canale vertebrale del midollo spinale, si raccomanda di somministrare il medicinale veterinario alla fine del periodo di volo degli insetti adulti e prima che le larve raggiungano le loro sedi finali nell'organismo. Tenere in considerazione le informazioni fornite nel paragrafo "Sovradosaggio".

Precauzioni speciali che devono essere adottate dalla persona che somministra il medicinale veterinario agli animali: Questo medicinale veterinario può essere irritante per la cute e gli occhi. Evitare il contatto con gli occhi e la cute. Gli operatori devono indossare guanti di gomma, stivali e soprabito impermeabile quando si somministra il medicinale veterinario. In caso di contatto accidentale con la cute, lavare immediatamente con acqua e sapone l'area interessata. In caso di contatto accidentale con gli occhi, sciacquare immediatamente ed abbondantemente con acqua. Se l'irritazione dovesse persistere, cercare consiglio medico. Non fumare, mangiare o bere quando si maneggia il medicinale veterinario. Lavare le mani dopo l'uso. Qualora l'abbigliamento sia contaminato, rimuoverlo appena possibile e farlo lavare prima dell'uso. Non ingerire. In caso di ingestione accidentale, sciacquare la bocca abbondantemente con acqua, cercare consiglio medico immediatamente e mostrare il foglietto illustrativo o l'etichetta al medico. Le persone con nota ipersensibilità al principio attivo o a qualsiasi degli eccipienti devono evitare contatti con il medicinale veterinario. L'eprinomectina può essere trasferita al latte materno. Pertanto, donne che allattano devono maneggiare il prodotto con grande attenzione.

Altre precauzioni: L'eprinomectina è molto tossica per la fauna che colonizza il letame e gli organismi acquatici, persiste nel terreno e si può accumulare nei sedimenti. Il rischio per l'ecosistema acquatico e per la popolazione colonizzante il letame può essere ridotto evitando l'impiego troppo frequente e ripetuto di eprinomectina (e prodotti della stessa classe di antelmintici) nei bovini, nelle pecore e capre. Il rischio per gli ecosistemi acquatici sarà ulteriormente ridotto tenendo gli animali trattati lontani da corsi d'acqua per due-cinque settimane dopo il trattamento.

Gravidanza e allattamento: Studi di laboratorio (ratto, coniglio) non hanno prodotto alcuna evidenza di effetti teratogenici o embriotossici dovuti all'uso dell'eprinomectina a dosi terapeutiche. Studi di laboratorio nei bovini non hanno prodotto alcuna evidenza di effetti teratogenici o fetotossici al dosaggio terapeutico consigliato. Può essere usato in bovine da latte durante la gravidanza e l'allattamento. Non è stata stabilita la sicurezza dell'eprinomectina durante la gravidanza in pecore e capre. Utilizzare solo in base alla valutazione rischio/beneficio da parte del medico veterinario in queste specie.

Interazione con altri medicinali veterinari ed altre forme d'interazione: Poiché l'eprinomectina si lega saldamente alle proteine del plasma, ciò dovrebbe essere tenuto in considerazione se usato in associazione con altre molecole che hanno le stesse caratteristiche.

Sovradosaggio (sintomi, procedure d'emergenza, antidoti): Non sono stati osservati segni clinici di tossicità in vitelli di 8 settimane di età trattati fino a 5 volte il dosaggio terapeutico (2,5 mg eprinomectina/kg p.c.) per 3 volte a 7 giorni di intervallo. Un vitello trattato con una singola dose 10x la dose raccomandata (5 mg/kg p.c.) negli studi di tollerabilità ha mostrato midriasi transitoria. Non si sono osservate altre reazioni avverse al dosaggio. Non si sono osservati segni clinici di tossicità allorché sono state trattate pecore dell'età di 17 settimane a dosaggi fino a 5 volte il dosaggio terapeutico (5 mg eprinomectina/kg peso corporeo) per 3 volte ad intervalli di 14 giorni. Non è stato identificato un antidoto.

Incompatibilità: Non pertinente.

PRECAUZIONI PARTICOLARI DA PRENDERE PER LO SMALTIMENTO DEL PRODOTTO NON UTILIZZATO O DEGLI EVENTUALI RIFIUTI

Questo medicinale veterinario è pericoloso per la vita acquatica. Non contaminare laghi e corsi d'acqua con il medicinale veterinario o contenitori vuoti. I medicinali non devono essere smaltiti nelle acque di scarico o nei rifiuti domestici. Chiedere al proprio medico veterinario o farmacista come fare per smaltire i medicinali di cui non si ha più bisogno. Queste misure servono a proteggere l'ambiente.

DATA DELL'ULTIMA REVISIONE DEL FOGLIETTO ILLUSTRATIVO: 09/2023

ALTRE INFORMAZIONI

Presentazioni: 1 flacone da 1L. 1 flacone da 2,5L. 1 flacone da 5L. Scatola di cartone con 1 flacone da 250 ml. Scatola di cartone con 1 flacone da 1L. Scatola di cartone con 1 flacone da 2,5L. Scatola di cartone con 1 flacone da 5L. È possibile che non tutte le confezioni siano commercializzate.

Proprietà ambientali: Vedere paragrafo "Altre precauzioni". Come altri lattoni macrociclici, l'eprinomectina ha il potenziale per interessare negativamente organismi non bersaglio. A seguito del trattamento, l'escrezione di livelli potenzialmente tossici di eprinomectina può aver luogo nel corso di diverse settimane. Fece di animali trattati contenenti eprinomectina escrete su pascoli possono ridurre l'abbondanza di organismi che si nutrono di letame e ciò può influenzare la degradazione del letame.

Altre informazioni: Questo medicinale veterinario è pericoloso per la vita acquatica. Non contaminare laghi e corsi d'acqua con il medicinale veterinario o contenitori vuoti. I medicinali non devono essere smaltiti nelle acque di scarico o nei rifiuti domestici. Chiedere al proprio medico veterinario o farmacista come fare per smaltire i medicinali di cui non si ha più bisogno. Queste misure servono a proteggere l'ambiente.

DATA DELL'ULTIMA REVISIONE DEL FOGLIETTO ILLUSTRATIVO: 09/2023

ALTRE INFORMAZIONI

Presentazioni: 1 flacone da 1L. 1 flacone da 2,5L. 1 flacone da 5L. Scatola di cartone con 1 flacone da 250 ml. Scatola di cartone con 1 flacone da 1L. Scatola di cartone con 1 flacone da 2,5L. Scatola di cartone con 1 flacone da 5L. È possibile che non tutte le confezioni siano commercializzate.

Proprietà ambientali: Vedere paragrafo "Altre precauzioni". Come altri lattoni macrociclici, l'eprinomectina ha il potenziale per interessare negativamente organismi non bersaglio. A seguito del trattamento, l'escrezione di livelli potenzialmente tossici di eprinomectina può aver luogo nel corso di diverse settimane. Fece di animali trattati contenenti eprinomectina escrete su pascoli possono ridurre l'abbondanza di organismi che si nutrono di letame e ciò può influenzare la degradazione del letame.

Altre informazioni: Questo medicinale veterinario è pericoloso per la vita acquatica. Non contaminare laghi e corsi d'acqua con il medicinale veterinario o contenitori vuoti. I medicinali non devono essere smaltiti nelle acque di scarico o nei rifiuti domestici. Chiedere al proprio medico veterinario o farmacista come fare per smaltire i medicinali di cui non si ha più bisogno. Queste misure servono a proteggere l'ambiente.

DATA DELL'ULTIMA REVISIONE DEL FOGLIETTO ILLUSTRATIVO: 09/2023

ALTRE INFORMAZIONI

Presentazioni: 1 flacone da 1L. 1 flacone da 2,5L. 1 flacone da 5L. Scatola di cartone con 1 flacone da 250 ml. Scatola di cartone con 1 flacone da 1L. Scatola di cartone con 1 flacone da 2,5L. Scatola di cartone con 1 flacone da 5L. È possibile che non tutte le confezioni siano commercializzate.

Proprietà ambientali: Vedere paragrafo "Altre precauzioni". Come altri lattoni macrociclici, l'eprinomectina ha il potenziale per interessare negativamente organismi non bersaglio. A seguito del trattamento, l'escrezione di livelli potenzialmente tossici di eprinomectina può aver luogo nel corso di diverse settimane. Fece di animali trattati contenenti eprinomectina escrete su pascoli possono ridurre l'abbondanza di organismi che si nutrono di letame e ciò può influenzare la degradazione del letame.

Altre informazioni: Questo medicinale veterinario è pericoloso per la vita acquatica. Non contaminare laghi e corsi d'acqua con il medicinale veterinario o contenitori vuoti. I medicinali non devono essere smaltiti nelle acque di scarico o nei rifiuti domestici. Chiedere al proprio medico veterinario o farmacista come fare per smaltire i medicinali di cui non si ha più bisogno. Queste misure servono a proteggere l'ambiente.

DATA DELL'ULTIMA REVISIONE DEL FOGLIETTO ILLUSTRATIVO: 09/2023

ALTRE INFORMAZIONI

Presentazioni: 1 flacone da 1L. 1 flacone da 2,5L. 1 flacone da 5L. Scatola di cartone con 1 flacone da 250 ml. Scatola di cartone con 1 flacone da 1L. Scatola di cartone con 1 flacone da 2,5L. Scatola di cartone con 1 flacone da 5L. È possibile che non tutte le confezioni siano commercializzate.

Proprietà ambientali: Vedere paragrafo "Altre precauzioni". Come altri lattoni macrociclici, l'eprinomectina ha il potenziale per interessare negativamente organismi non bersaglio. A seguito del trattamento, l'escrezione di livelli potenzialmente tossici di eprinomectina può aver luogo nel corso di diverse settimane. Fece di animali trattati contenenti eprinomectina escrete su pascoli possono ridurre l'abbondanza di organismi che si nutrono di letame e ciò può influenzare la degradazione del letame.

Altre informazioni: Questo medicinale veterinario è pericoloso per la vita acquatica. Non contaminare laghi e corsi d'acqua con il medicinale veterinario o contenitori vuoti. I medicinali non devono essere smaltiti nelle acque di scarico o nei rifiuti domestici. Chiedere al proprio medico veterinario o farmacista come fare per smaltire i medicinali di cui non si ha più bisogno. Queste misure servono a proteggere l'ambiente.

DATA DELL'ULTIMA REVISIONE DEL FOGLIETTO ILLUSTRATIVO: 09/2023

ALTRE INFORMAZIONI

Presentazioni: 1 flacone da 1L. 1 flacone da 2,5L. 1 flacone da 5L. Scatola di cartone con 1 flacone da 250 ml. Scatola di cartone con 1 flacone da 1L. Scatola di cartone con 1 flacone da 2,5L. Scatola di cartone con 1 flacone da 5L. È possibile che non tutte le confezioni siano commercializzate.

Proprietà ambientali: Vedere paragrafo "Altre precauzioni". Come altri lattoni macrociclici, l'eprinomectina ha il potenziale per interessare negativamente organismi non bersaglio. A seguito del trattamento, l'escrezione di livelli potenzialmente tossici di eprinomectina può aver luogo nel corso di diverse settimane. Fece di animali trattati contenenti eprinomectina escrete su pascoli possono ridurre l'abbondanza di organismi che si nutrono di letame e ciò può influenzare la degradazione del letame.

Altre informazioni: Questo medicinale veterinario è pericoloso per la vita acquatica. Non contaminare laghi e corsi d'acqua con il medicinale veterinario o contenitori vuoti. I medicinali non devono essere smaltiti nelle acque di scarico o nei rifiuti domestici. Chiedere al proprio medico veterinario o farmacista come fare per smaltire i medicinali di cui non si ha più bisogno. Queste misure servono a proteggere l'ambiente.

DATA DELL'ULTIMA REVISIONE DEL FOGLIETTO ILLUSTRATIVO: 09/2023

ALTRE INFORMAZIONI

Presentazioni: 1 flacone da 1L. 1 flacone da 2,5L. 1 flacone da 5L. Scatola di cartone con 1 flacone da 250 ml. Scatola di cartone con 1 flacone da 1L. Scatola di cartone con 1 flacone da 2,5L. Scatola di cartone con 1 flacone da 5L. È possibile che non tutte le confezioni siano commercializzate.

Proprietà ambientali: Vedere paragrafo "Altre precauzioni". Come altri lattoni macrociclici, l'eprinomectina ha il potenziale per interessare negativamente organismi non bersaglio. A seguito del trattamento, l'escrezione di livelli potenzialmente tossici di eprinomectina può aver luogo nel corso di diverse settimane. Fece di animali trattati contenenti eprinomectina escrete su pascoli possono ridurre l'abbondanza di organismi che si nutrono di letame e ciò può influenzare la degradazione del letame.

Altre informazioni: Questo medicinale veterinario è pericoloso per la vita acquatica. Non contaminare laghi e corsi d'acqua con il medicinale veterinario o contenitori vuoti. I medicinali non devono essere smaltiti nelle acque di scarico o nei rifiuti domestici. Chiedere al proprio medico veterinario o farmacista come fare per smaltire i medicinali di cui non si ha più bisogno. Queste misure servono a proteggere l'ambiente.

DATA DELL'ULTIMA REVISIONE DEL FOGLIETTO ILLUSTRATIVO: 09/2023

ALTRE INFORMAZIONI

Presentazioni: 1 flacone da 1L. 1 flacone da 2,5L. 1 flacone da 5L. Scatola di cartone con 1 flacone da 250 ml. Scatola di cartone con 1 flacone da 1L. Scatola di cartone con 1 flacone da 2,5L. Scatola di cartone con 1 flacone da 5L. È possibile che non tutte le confezioni siano commercializzate.

Proprietà ambientali: Vedere paragrafo "Altre precauzioni". Come altri lattoni macrociclici, l'eprinomectina ha il potenziale per interessare negativamente organismi non bersaglio. A seguito del trattamento, l'escrezione di livelli potenzialmente tossici di eprinomectina può aver luogo nel corso di diverse settimane. Fece di animali trattati contenenti eprinomectina escrete su pascoli possono ridurre l'abbondanza di organismi che si nutrono di letame e ciò può influenzare la degradazione del letame.

Altre informazioni: Questo medicinale veterinario è pericoloso per la vita acquatica. Non contaminare laghi e corsi d'acqua con il medicinale veterinario o contenitori vuoti. I medicinali non devono essere smaltiti nelle acque di scarico o nei rifiuti domestici. Chiedere al proprio medico veterinario o farmacista come fare per smaltire i medicinali di cui non si ha più bisogno. Queste misure servono a proteggere l'ambiente.

DATA DELL'ULTIMA REVISIONE DEL FOGLIETTO ILLUSTRATIVO: 09/2023

ALTRE INFORMAZIONI

Presentazioni: 1 flacone da 1L. 1 flacone da 2,5L. 1 flacone da 5L. Scatola di cartone con 1 flacone da 250 ml. Scatola di cartone con 1 flacone da 1L. Scatola di cartone con 1 flacone da 2,5L. Scatola di cartone con 1 flacone da 5L. È possibile che non tutte le confezioni siano commercializzate.

Proprietà ambientali: Vedere paragrafo "Altre precauzioni". Come altri lattoni macrociclici, l'eprinomectina ha il potenziale per interessare negativamente organismi non bersaglio. A seguito del trattamento, l'escrezione di livelli potenzialmente tossici di eprinomectina può aver luogo nel corso di diverse settimane. Fece di animali trattati contenenti eprinomectina escrete su pascoli possono ridurre l'abbondanza di organismi che si nutrono di letame e ciò può influenzare la degradazione del letame.

Altre informazioni: Questo medicinale veterinario è pericoloso per la vita acquatica. Non contaminare laghi e corsi d'acqua con il medicinale veterinario o contenitori vuoti. I medicinali non devono essere smaltiti nelle acque di scarico o nei rifiuti domestici. Chiedere al proprio medico veterinario o farmacista come fare per smaltire i medicinali di cui non si ha più bisogno. Queste misure servono a proteggere l'ambiente.

DATA DELL'ULTIMA REVISIONE DEL FOGLIETTO ILLUSTRATIVO: 09/2023

ALTRE INFORMAZIONI

Presentazioni: 1 flacone da 1L. 1 flacone da 2,5L. 1 flacone da 5L. Scatola di cartone con 1 flacone da 250 ml. Scatola di cartone con 1 flacone da 1L. Scatola di cartone con 1 flacone da 2,5L. Scatola di cartone con 1 flacone da 5L. È possibile che non tutte le confezioni siano commercializzate.

Proprietà ambientali: Vedere paragrafo "Altre precauzioni". Come altri lattoni macrociclici, l'eprinomectina ha il potenziale per interessare negativamente organismi non bersaglio. A seguito del trattamento, l'escrezione di livelli potenzialmente tossici di eprinomectina può aver luogo nel corso di diverse settimane. Fece di animali trattati contenenti eprinomectina escrete su pascoli possono ridurre l'abbondanza di organismi che si nutrono di letame e ciò può influenzare la degradazione del letame.

Altre informazioni: Questo medicinale veterinario è pericoloso per la vita acquatica. Non contaminare laghi e corsi d'acqua con il medicinale veterinario o contenitori vuoti. I medicinali non devono essere smaltiti nelle acque di scarico o nei rifiuti domestici. Chiedere al proprio medico veterinario o farmacista come fare per smaltire i medicinali di cui non si ha più bisogno. Queste misure servono a proteggere l'ambiente.

DATA DELL'ULTIMA REVISIONE DEL FOGLIETTO ILLUSTRATIVO: 09/2023

ALTRE INFORMAZIONI

Presentazioni: 1 flacone da 1L. 1 flacone da 2,5L. 1 flacone da 5L. Scatola di cartone con 1 flacone da 250 ml. Scatola di cartone con 1 flacone da 1L. Scatola di cartone con 1 flacone da 2,5L. Scatola di cartone con 1 flacone da 5L. È possibile che non tutte le confezioni siano commercializzate.

Proprietà ambientali: Vedere paragrafo "Altre precauzioni". Come altri lattoni macrociclici, l'eprinomectina ha il potenziale per interessare negativamente organismi non bersaglio. A seguito del trattamento, l'escrezione di livelli potenzialmente tossici di eprinomectina può aver luogo nel corso di diverse settimane. Fece di animali trattati contenenti eprinomectina escrete su pascoli possono ridurre l'abbondanza di organismi che si nutrono di letame e ciò può influenzare la degradazione del letame.

Altre informazioni: Questo medicinale veterinario è pericoloso per la vita acquatica. Non contaminare laghi e corsi d'acqua con il medicinale veterinario o contenitori vuoti. I medicinali non devono essere smaltiti nelle acque di scarico o nei rifiuti domestici. Chiedere al proprio medico veterinario o farmacista come fare per smaltire i medicinali di cui non si ha più bisogno. Queste misure servono a proteggere l'ambiente.

DATA DELL'ULTIMA REVISIONE DEL FOGLIETTO ILLUSTRATIVO: 09/2023

ALTRE INFORMAZIONI

Presentazioni: 1 flacone da 1L. 1 flacone da 2,5L. 1 flacone da 5L. Scatola di cartone con 1 flacone da 250 ml. Scatola di cartone con 1 flacone da 1L. Scatola di cartone con 1 flacone da 2,5L. Scatola di cartone con 1 flacone da 5L. È possibile che non tutte le confezioni siano commercializzate.

Proprietà ambientali: Vedere paragrafo "Altre precauzioni". Come altri lattoni macrociclici, l'eprinomectina ha il potenziale per interessare negativamente organismi non bersaglio. A seguito del trattamento, l'escrezione di livelli potenzialmente tossici di eprinomectina può aver luogo nel corso di diverse settimane. Fece di animali trattati contenenti eprinomectina escrete su pascoli possono ridurre l'abbondanza di organismi che si nutrono di letame e ciò può influenzare la degradazione del letame.

Altre informazioni: Questo medicinale veterinario è pericoloso per la vita acquatica. Non contaminare laghi e corsi d'acqua con il medicinale veterinario o contenitori vuoti. I medicinali non devono essere smaltiti nelle acque di scarico o nei rifiuti domestici. Chiedere al proprio medico veterinario o farmacista come fare per smaltire i medicinali di cui non si ha più bisogno. Queste misure servono a proteggere l'ambiente.

DATA DELL'ULTIMA REVISIONE DEL FOGLIETTO ILLUSTRATIVO: 09/2023

ALTRE INFORMAZIONI

Presentazioni: 1 flacone da 1L. 1 flacone da 2,5L. 1 flacone da 5L. Scatola di cartone con 1 flacone da 250 ml. Scatola di cartone con 1 flacone da 1L. Scatola di cartone con 1 flacone da 2,5L. Scatola di cartone con 1 flacone da 5L. È possibile che non tutte le confezioni siano commercializzate.

Proprietà ambientali: Vedere paragrafo "Altre precauzioni". Come altri lattoni macrociclici, l'eprinomectina ha il potenziale per interessare negativamente organismi non bersaglio. A seguito del trattamento, l'escrezione di livelli potenzialmente tossici di eprinomectina può aver luogo nel corso di diverse settimane. Fece di animali trattati contenenti eprinomectina escrete su pascoli possono ridurre l'abbondanza di organismi che si nutrono di letame e ciò può influenzare la degradazione del letame.

Altre informazioni: Questo medicinale veterinario è pericoloso per la vita acquatica. Non contaminare laghi e corsi d'acqua con il medicinale veterinario o contenitori vuoti. I medicinali non devono essere smaltiti nelle acque di scarico o nei rifiuti domestici. Chiedere al proprio medico veterinario o farmacista come fare per smaltire i medicinali di cui non si ha più bisogno. Queste misure servono a proteggere l'ambiente.

DATA DELL'ULTIMA REVISIONE DEL FOGLIETTO ILLUSTRATIVO: 09/2023

ALTRE INFORMAZIONI

Presentazioni: 1 flacone da 1L. 1 flacone da 2,5L. 1 flacone da 5L. Scatola di cartone con 1 flacone da 250 ml. Scatola di cartone con 1 flacone da 1L. Scatola di cartone con 1 flacone da 2,5L. Scatola di cartone con 1 flacone da 5L. È possibile che non tutte le confezioni siano commercializzate.

Proprietà ambientali: Vedere paragrafo "Altre precauzioni". Come altri lattoni macrociclici, l'eprinomectina ha il potenziale per interessare negativamente organismi non bersaglio. A seguito del trattamento, l'escrezione di livelli potenzialmente tossici di eprinomectina può aver luogo nel corso di diverse settimane. Fece di animali trattati contenenti eprinomectina escrete su pascoli possono ridurre l'abbondanza di organismi che si nutrono di letame e ciò può influenzare la degradazione del letame.

Altre informazioni: Questo medicinale veterinario è pericoloso per la vita acquatica. Non contaminare laghi e corsi d'acqua con il medicinale veterinario o contenitori vuoti. I medicinali non devono essere smaltiti nelle acque di scarico o nei rifiuti domestici. Chiedere al proprio medico veterinario o farmacista come fare per smaltire i medicinali di cui non si ha più bisogno. Queste misure servono a proteggere l'ambiente.

DATA DELL'ULTIMA REVISIONE DEL FOGLIETTO ILLUSTRATIVO: 09/2023

ALTRE INFORMAZIONI

Presentazioni:

NOT EPRECIS POUR ON IL FR DE IT HU 840x160/FP35,5x160 Recto Verso CODE ARTICLE : A4533-01 Black	EPRECIS POUR ON IL FR DE IT HU ID : 79886 CORPS : 8 pts
---	---

LAURENT 24/05/23