

contro la Diarrea Virale dei bovini

Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio:

Ceva Salute Animale S.p.A., Via dei Valtorta 48, 20127 Milano - Italia.

Titolare dell'autorizzazione alla produzione responsabile del rilascio dei lotti di fabbricazione: Ceva-Phylaxia Co. Ltd., 1107 Budapest Szállás u. 5., Ungheria.

Denominazione del medicinale veterinario

MUCOSIFFA®, liofilizzato e solvente per sospensione iniettabile per bovini.

Indicazione del principio attivo e degli altri ingredienti

Ogni dose di vaccino ricostituito contiene:

Principio attivo:

Solvente (acqua p.p.i.)

Indicazioni

Immunizzazione attiva dei bovini contro il virus della Diarrea Virale dei bovini (BVDV) di tipo I.

Protezione crociata dei bovini nei confronti del virus della Diarrea Virale dei bovini (BVDV) di tipo 2.

Protezione del feto.

Prevenzione della mortalità, dei segni clinici e/o delle lesioni causate dal virus della Diarrea Virale dei bovini (BVDV) di tipo I e 2. Nei soggetti con più di sei mesi, un'unica somministrazione è sufficiente per ottenere un'immunità che permane almeno per un anno.

Controindicazioni: Nessuna.

Reazioni avverse



Nessuna nota.

Se dovessero manifestarsi reazioni avverse gravi o altre reazioni non menzionate in questo foglietto illustrativo, si prega di informarne il veterinario.



Specie di destinazione: Bovini.

Posologia, via e modalità di somministrazione

Ricostituire ciascuna dose di vaccino con due mi di diluente.

Via di somministrazione: intramuscolare.

Posologia: una dose da 2 ml secondo i seguenti schemi vaccinali:



Riproduttori:

Vaccinazione di base:

Manze destinate alla riproduzione: una iniezione tra i 6 mesi di vita ed 1 mese dalla prima

inseminazione.

Richiami: Annuali.

Bovini con più di 6 mesi di vita:

- Vaccinazione di base: I sola iniezione.
- Richiami: annuali.

Vitelli

Vaccinazione di base:

Soggetti nati da madri non vaccinate:

- l° iniezione a partire dall'età di 8 giorni.
- 2° iniezione a 5-6 mesi di vita.

Soggetti nati da madri vaccinate:

- la prima iniezione è consigliata a 2-3 mesi di vita ed è destinata a proteggere, in ambiente infetto, gli animali che hanno già eliminato completamente i loro anticorpi di origine colostrale;
- una seconda iniezione a 5-6 mesi di vita, per assicurare l'immunizzazione dei vitelli che avevano ancora anticorpi di origine colostrale al momento della prima iniezione.

Richiami: a circa un anno di età.



Tempo di attesa: Zero giorni.

Particolari precauzioni per la conservazione

Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Conservare in frigorifero (2°C - 8°C).

Proteggere dalla luce. Non congelare.

Dopo la ricostituzione il prodotto deve essere consumato immediatamente e non conservato.

Avvertenze speciali

Precauzioni speciali per l'impiego

Precauzioni speciali per l'impiego negli animali

Vaccinare solamente animali in buono stato di salute.

Rispettare le consuete norme di asepsi.

Per la preparazione del vaccino ricostituito e l'iniezione utilizzare materiali sterili e privi di tracce di antisettici o disinfettanti.

La vaccinazione dell'animale gravido deve essere naturalmente seguita da una precoce e quantitativamente sufficiente somministrazione di colostro al neonato.

L'infezione del feto nei primi mesi di gestazione può indurre, nel feto stesso, uno stato di immunotolleranza che pregiudicherà l'immunizzazione attiva indotta da una vaccinazione eventualmente eseguita nell'animale quando sarà già nato.

Distruggere il vaccino inutilizzato e disinfettare i flaconi vuoti prima di eliminarli.

Precauzioni speciali che devono essere adottate dalla persona che somministra il prodotto agli animali

Utilizzare il vaccino immediatamente dopo la ricostituzione del liofilizzato con il solvente. In caso di autoiniezione accidentale, rivolgersi immediatamente ad un medico mostrandogli il foglietto illustrativo o l'etichetta del prodotto.

Impiego durante la gravidanza, l'allattamento o l'ovodeposizione

Femmine gravide o in lattazione possono essere vaccinate. Durante le prove cliniche non si sono osservati eventi avversi in queste categorie di animali. Il vaccino può essere usato durante la gravidanza.

Interazioni con altri medicinali veterinari ed altre forme di interazione

Non sono disponibili informazioni sulla sicurezza ed efficacia dell'uso concomitante di questo vaccino con altri. Pertanto la decisione di utilizzare questo vaccino prima o dopo un altro medicinale veterinario deve essere valutata

Sovradosaggio (sintomi, procedure d'emergenza, antidoti) se necessario

Non si è osservato alcun evento avverso dopo la somministrazione di almeno 10 dosi di vaccino.

Incompatibilità

Non miscelare con altri vaccini o medicinali ad azione immunologica.

Non mescolare estemporaneamente MUCOSIFFA® con altri farmaci contenenti sostanze tensioattive o antisettici.

Precauzioni particolari da prendere per lo smaltimento del prodotto non utilizzato o degli eventuali rifiuti

Tutti i medicinali veterinari non utilizzati o i rifiuti derivati da tali medicinali devono essere smaltiti in conformità alle disposizioni di legge locali e conferiti negli idonei sistemi di raccolta e di smaltimento per i medicinali non utilizzati o scaduti.

Eliminare i rifiuti mediante ebollizione, incenerimento o immersione in un disinfettante idoneo approvato per l'uso dalle autorità competenti.

Data dell'ultima revisione del foglietto illustrativo: 09/2023.

Altre informazioni

Confezioni:

Flacone monodose con relativo flacone di solvente da 2 ml

A.I.C. n. 101611022 del Ministero della Salute

Flacone da 10 dosi con relativo flacone di solvente da 20 ml

A.I.C. n. 101611010 del Ministero della Salute

È possibile che non tutte le confezioni siano commercializzate.

Da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Solo per uso veterinario.

NOT MUCOSIFFA 10D IT MUCOSIFFA 10D+SOLV 20ML 200x130/FP 26,5x69 ITALIE

Recto Verso

LAURENT 07/06/23