

- Injectar uma prostaglandina (PGF2α) ou análogo, 24 horas antes da remoção do dispositivo.
- Remover o dispositivo.
- Em animais devem ser inseminados 56 horas após a remoção do dispositivo.
- Os animais devem ser inseminados 56 horas após a remoção do dispositivo.
- Inserti o dispositivo por 7 dias.
- Injectar GnRH ou análogo aquando da inserção do dispositivo.
- Injectar uma prostaglandina (PGF2α) ou análogo, 24 horas antes da remoção do dispositivo.
- Os animais devem ser inseminados 56 horas após a remoção do dispositivo, ou
- Injectar GnRH ou análogo 36 horas após a remoção do dispositivo e IATF 16 a 20 horas depois.
- Ou, em alternativa:
- Inserti o dispositivo por 7 dias.
- Injectar GnRH ou análogo aquando da inserção do dispositivo.
- Na remoção do dispositivo, injectar prostaglandina (PGF2α) ou análogo.
- Injectar GnRH ou análogo 56 horas após a remoção do dispositivo.
- Os animais devem ser inseminados 16 a 20 horas depois.

*Em vacas e novilhas não cíclicas:*

- Inserti o dispositivo por 7 dias.
- Injectar uma prostaglandina (PGF2α) ou análogo, 24 horas antes da remoção do dispositivo.
- Injectar eCG no momento da remoção do dispositivo.
- Os animais devem ser inseminados 56 horas após a remoção do dispositivo.

**Aplicação do dispositivo:**

Usando um aplicador, inseri um dispositivo na vagina do animal. O dispositivo intravaginal deve permanecer no local durante 7 dias. O dispositivo destina-se a uma única utilização.

**Instruções com vista a uma administração correta**

**Modo de utilização do aplicador e inserção:**

A administração do dispositivo deve fazer-se com recurso a um aplicador, seguindo o procedimento seguinte:

1. Antes de administrar, limpar e desinfetar o aplicador numa solução antisséptica não irritante.
2. Dobrar o dispositivo e inseri-lo no aplicador. A extremidade distal da haste do dispositivo deve estar fora do aplicador. Devem ser tomadas precauções para evitar o manuseamento desnecessário ou prolongado do medicamento veterinário para minimizar a transferência da substância ativa para as luvas do operador.
3. Aplicar uma pequena quantidade de lubrificante obstétrico na extremidade do aplicador contendo o dispositivo.

4. Levantar a cauda do animal e limpar a vulva e o períneo.
5. Inserir cuidadosamente o aplicador na vagina, primeiro numa direcção vertical e depois na horizontal até à primeira resistência.

6. Verificar se a haste de remoção está solta, pressionar o cabo do aplicador e puxá-lo para fora, deixando a cauda de remoção pendurada na vulva.
7. Limpar e desinfetar o aplicador após utilização e antes de ser utilizado noutro animal.

**Remoção:**

Remover 7 dias após a inserção, puxando suavemente a haste de remoção. Em algumas ocasiões, a haste poderá não ser visível no exterior do animal e, nestes casos, pode ser localizada na parte posterior da vagina utilizando um dedo protegido por luva. A remoção do dispositivo não deve requerer força. Se se verificar alguma resistência, deve utilizar-se a mão protegida com luva para facilitar a remoção. Se for verificada alguma dificuldade na remoção com o procedimento acima descrito, deverá solicitar-se aconselhamento médico veterinário.

**Intervalos de segurança**

Carne e vísceras: zero dias. Leite: zero horas.

**Precauções especiais de conservação**

Mantêr fora da vista e do alcance das crianças. Este medicamento veterinário não necessita de quaisquer precauções especiais de conservação. Prazo de validade após a primeira abertura da saqueta primária: 6 meses. Não administrar este medicamento veterinário depois de expirado o prazo de validade indicado na cartãozinho e saqueta depois de Exp. O prazo de validade corresponde ao último dia do mês indicado.

**Precauções especiais de eliminação**

Os medicamentos não devem ser eliminados no lixo ou nos esgotos domésticos. Utilize regimes de recolha de medicamentos veterinários para a eliminação de medicamentos veterinários não utilizados ou de resíduos resultantes da utilização desses medicamentos, em cumprimento dos requisitos nacionais e de quaisquer sistemas de recolha nacionais aplicáveis. Estas medidas destinam-se a ajudar a proteger o ambiente. Pergunte ao seu médico veterinário ou farmacêutico como deve eliminar os medicamentos veterinários que já não são necessários.

**Classificação dos medicamentos veterinários**

Medicamento veterinário sujeito a receita médica-veterinária.

**Números de autorização de introdução no mercado e tamanhos de embalagem**

AIM<sup>1</sup> № 261/01/10DFVPT.

**Tamanhos de embalagem:**

Caixa de cartão com 10 saquetas de 1 dispositivo.

Caixa de cartão com 25 saquetas de 1 dispositivo.

Caixa de cartão com 1 aplicador e 25 saquetas de 1 dispositivo.

Caixa de cartão com 50 saquetas de 1 dispositivo.

Caixa de cartão com 100 saquetas de 1 dispositivo.

Caixa de cartão com 1 aplicador e 50 saquetas de 1 dispositivo.

Caixa de polietileno com 50 saquetas de 1 dispositivo.

Caixa de polietileno com 1 aplicador e 50 saquetas de 1 dispositivo.

Saquetas com 10 dispositivos.

É possível que os folhetos comercializados todas as apresentações.

**Data em que o nosso informativo foi revisto pela última vez :** 04/2026

Está disponível informação pormenorizada sobre este medicamento veterinário na base de dados de medicamentos da União Europeia Union Product Database (https://medicines.health.europa.eu/veterinary).

**Detalhes de contacto**

**Titular da Autorização de Introdução no Mercado:**

Ceva Saúde Animal - Produtos Farmacêuticos e Imunológicos, Lda., Rua Doutor António Loureiro Borges, nº 99A, 9ª, Miraflores- 1495-131 Algés, Portugal
**Detalhes de contacto para comunicar suspeitas de eventos adversos:**
Ceva Santé Animale, 8 rue de Logrono - 33500 Libourne, França
Tel: +800 35 22 11 51 - E-mail: pharmacovigilance@ceva.com
**Fabricante responsável pela libertação do lote:**
Ceva Santé Animale, 8 rue de Logrono, 33500 Libourne, França

**Outras informações**

**Propriedades farmacodinâmicas**

A progesterona interage com recetores intranucleares específicos e liga-se a sequências específicas de DNA do animal, iniciando a transcrição de um grupo específico de genes, o qual é, finalmente, responsável pela tradução da ação hormonal em eventos fisiológicos. A progesterona exerce um efeito de feedback negativo no eixo hipotalamo-hipófise, principalmente na GnRH e, consequentemente, na secreção de LH. A progesterona impede o pico hormonal da hipófise (FSH e LH), e, desta forma, suprime o estro e a ovulação. Aquando da remoção, os níveis de progesterona caem drasticamente numa hora permitindo a maturação folicular, estro e ovulação numa janela estreita.

**Propriedades farmacocinéticas**

A progesterona é rapidamente absorvida pela via intravaginal. A progesterona em circulação está ligada às proteínas do sangue. A progesterona liga-se à globulina de ligação aos corticosteróides (GLC) e à albumina. A progesterona acumula-se no tecido adiposo devido às suas propriedades lipofílicas e em tecidos/órgãos contendo recetores da progesterona. O fígado é o local principal de metabolização da progesterona. A progesterona tem uma semivida de 3 horas, uma Cmax de 5µg/L e uma Tmax de 9h. A principal via de excreção é através das fezes e a via secundária através da urina.

**Denumirea do produto medicinal veterinár**

PRID delta 1,55 g dispositivo cu aplicare intravaginală pentru bovine

**Compoziție**

1,55 g progesteron per dispozitiv

Dispozitiv triunghiular, albicios, cu prelungitor din plastic.

**Specii țintă**

Bovine (vacı și vitele).

**Indicații de utilizare**

Pentru controlul ciclului sexual la vaci și vitele, inclusiv:

- sincronizarea estrului inclusiv protocoalele de inseminare artificială programată (FTAI)
- sincronizarea estrului animalelor donatoare și receptoare pentru transferul de embrioni. Se va utiliza în combinație cu o prostaglandină (PGF2α sau analog)
- Inducerea și sincronizarea estrului la vacile cu sau fără activate ovariană cíclică inclusiv la cele incluse în protocoalele de inseminare artificială programată (FTAI);
- la vacile cu activate ovariană cíclică: se va utiliza în combinație cu prostaglandină (PGF2α sau analog)
- la vacile cu sau fără activate ovariană cíclică: se va utiliza în combinație hormonal de eliberare a gonadotropinelor (GnRH) sau analog și cu PGF2α sau analog.
- la vacile fără activate ovariană cíclică: se va utiliza în combinație cu PGFα sau analog și cu gonadotropină corionică eqvină (eCG).

**Contraindicații**

Nu se utilizează la vitele imature sexual sau la femelele cu tract genital anormal (de exemplu cele cu freemartinitism). Nu se utilizează înainte de 35 zile de la precedenta fătare. Nu se utilizează la animalele care prezintă boli infecțioase sau non infecțioase ale tractului genital. Nu se utilizează la animalele gestante.

**Atenționări speciale**

**Atenționări speciale:** Procentul de vaci care prezintă estru într-o anumită perioadă după tratament este de obicei mai mare decât la vacile netratate și faza luteală ulterioară are o durată normală. Totuși, numai tratamentul cu progesteron, conform cu regimul de dozare propus, nu este suficient pentru a induce estrul și ovulația la femelele cu activate sexuală cíclică. În vederea optimizării protocolului este recomandată să se determine activitatea ovariană cíclică înainte de administrarea tratamentului cu progesteron. Animalele cu stare proastă de întreținere, fie datorită bolilor, nutriției inadecvate, stresului inutil sau a altor factori, pot să răspundă slab la tratament.

**Precauți speciale pentru utilizarea în siguranță la speciile țintă:** Nu este cazul.

**Precauți speciale care trebuie luate de persoana care administrează produsul medicinal veterinár la animale:** La manipulara produsului medicinal veterinár trebuie purtat echipament de protecție personal constând din mănuși. A nu se bea sau mânca în timpul manipularii produsului medicinal veterinár. După utilizare se recomandă spălarea mâinilor.

**Gestăie și lactație**

Poate fi utilizat în perioada de lactație. Nu se utilizează înainte de 35 zile de la precedenta fătare.

Studiile de laborator la sobolan și la iepuri au prezentat dovezi ale efectului fetotoxic, după administrări intramusculare sau subcutanate și la doze mai repetate de progesteron. Nu se utilizează în perioada de gestație.

**Interacțiunea cu alte produse medicinale și alte forme de interacțiune:**

Nu se cunosc.

**Supradozi:** Nu este cazul.

**Incompatibilități majore:** Nu se cunosc.

**Evenimente adverse**

|                                                                                    |                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Bovine:                                                                            |                                                                            |
| Foarte frecvente (>1 animal / 10 animale tratate):                                 | Surgeri vaginale. <sup>1,2</sup>                                           |
| Foarte rare (<1 animal / 10 000 de animale tratate, inclusiv raportările izolate): | Infламarea locului de aplicare (inflamarea peretelui vaginal) <sup>3</sup> |

<sup>1</sup>Se pot observa secreții vulvare tulburi la extragerea dispozitivului.

<sup>2</sup>Moderate, local, disparând rapid fără niciun tratament între extragere și inseminare și nu afectează fertilitatea la inseminare sau ratele de succes ale gestației.

Raportarea evenimentelor adverse este importantă. Permite monitorizarea continuă a siguranței unui produs. Dacă observați orice reacții adverse, chiar și cele care nu sunt deja enumerate în acest prospect, sau credeți că medicamentul nu a avut efect, vă rugăm să contactați mai întâi medicul dumneavoastră veterinar. De asemenea, puteți raporta evenimentele adverse către detinătorul autorizației de comercializare utilizând datele de contact de la sfârșitul acestui prospect sau prin sistemul național de raportare: farmakovigilanta@ansv.ro; icbm@cbmv.ro.

**Doze pentru fiecare specie, căi de administrare și metode de administrare**
Administrare intravaginală. 1,55 g progesteron / animal timp de 7 zile.

Alegerea protocolului de utilizare trebuie să aparțină medicului veterinar responsabil de tratament, pe baza obiectivelor tratamentului pentru fiecare efectiv sau vacă în parte. Se pot utiliza protocoalele de mai jos.

**Pentru sincronizarea estrului (inclusiv pentru sincronizarea estrului la animalele donatoare și receptoare pentru transfer de embrioni)**

- Introduceți dispozitivul pentru o perioadă de 7 zile
- Injectați o prostaglandină (PGF2α) sau analog cu 24 ore înainte de scoaterea dispozitivului.
- Scoateți dispozitivul

- La animalele care răspund la tratament, estrul apare în general în decurs de 1-3 zile după scoaterea dispozitivului. Vacile trebuie inseminate în decurs de 12 ore de la primele semne de călduri observate.

**Pentru inducerea și sincronizarea estrului pentru inseminare artificială programată (FTAI)**
Următoarele protocoale FTAI sunt frecvent menționate în literatura de specialitate:

- La vacile cu activate ovariană cíclică:
- Introduceți dispozitivul pentru o perioadă de 7 zile
- Injectați o prostaglandină (PGF2α) sau analog cu 24 ore înainte de scoaterea dispozitivului.
- Scoateți dispozitivul
- Animalele trebuie inseminate la 56 ore după scoaterea dispozitivului.
- La vacile cu sau fără activate ovariană cíclică (inclusiv vacile receptoare):
- Introduceți dispozitivul pentru o perioadă de 7 zile
- Injectați GnRH sau analog în momentul introducerii
- Injectați o prostaglandină (PGF2α) sau analog cu 24 ore înainte de scoaterea dispozitivului.
- Animalele trebuie inseminate la 56 ore după scoaterea dispozitivului, sau
- Injectați GnRH sau analog la 36 ore după scoaterea dispozitivului și realizați FTAI după 16-20 ore.

Sau ca alternativă:

- Introduceți dispozitivul pentru o perioadă de 7 zile
- Injectați GnRH sau analog în momentul introducerii
- La scoaterea dispozitivului injectați prostaglandină (PGF2α) sau analog
- Injectați GnRH sau analog la 56 ore după scoaterea dispozitivului
- Animalele trebuie inseminate după 16-20 ore
- La vacile fără activate ovariană cíclică:
- Introduceți dispozitivul pentru o perioadă de 7 zile
- Injectați o prostaglandină (PGF2α) sau analog cu 24 ore înainte de scoaterea dispozitivului.
- Injectați eCG în momentul scoaterii dispozitivului
- Animalele trebuie inseminate la 56 ore după scoaterea dispozitivului.

**Informații privind utilizarea:**

Dispozitivul se introduce în vagin cu ajutorul unui aplicator. Dispozitivul intravaginal trebuie să rămână introdus în interiorul vaginului timp de 7 zile. Dispozitivele sunt doar pentru o singură utilizare.

**Recomandări privind administrarea corectă**

**Modul de utilizare al aplicatorului și introducerea:**

Pentru administrare, trebuie utilizat un aplicator, după instrucțiunile de mai jos:

1. Înainte de utilizare, curățați și dezinfectați aplicatorul într-o soluție antiseptică neiritantă.
2. Pliși dispozitivul și introduceți-l în aplicator. Capătul cozi dispozitivului trebuie să rămână afară din aplicator. Aveți grijă să evitați manipulara prelungții sau întinut a produsului pentru a reduce la minim transferul substanței active pe mînușile operatorului.
3. Aplicați o cantitate mică de lubrifrant obstetrical pe capătul aplicatorului încărcat.
4. Ridicați coada animalului și curățați vulva și perineul.
5. Introduceți cu blândețe aplicatorul în vagin, mai întâi în direcție verticală și apoi orizontală până întâmpinați ceva rezistență.

6. Asigurați-vă că prelungitorul de extragere este liber, apăsați pe mânerul aplicatorului și scoateți-l, lăsând prelungitorul de extragere atârînd în direcția vulvei.
7. După utilizare și înainte de utilizarea la alt animal, curățați și dezinfectați aplicatorul.

**Retragerea:**

Scoateți dispozitivul la 7 zile de la introducerea prin tragerea ușoară de prelungitorul de extragere. Uneori, prelungitorul de extragere poate să nu fie vizibil la exterior, în aceste cazuri putând fi localizat în vaginul posterior utilizând un deget protejat de mînușă. Extragerea dispozitivului nu trebuie să se facă cu forță. Dacă se întâmpină ceva rezistență, se utilizează mâna înmînușată pentru a-l extrage cu ușurință. În cazul în care, dincolo de cele menționate mai sus, există dificultăți în scoaterea dispozitivului, trebuie solicitat sfatul medicului veterinar.

**Perioade de așteptare:** Carne și organe: zero zile. Lapte: zero ore.

**Precauți speciale pentru dispozitare:** A nu se lăsa la vederea și îndemna copilor. Acest produs medicinal veterinar nu necesită condiții speciale de depozitare. Termenul de valabilitate după prima deschidere a ambalajului primar: 6 luni. Nu utilizați acest produs medicinal veterinar după data expirării marcată pe cutie de carton și plic după Exp. Data de expirare se referă la ultima zi a lunii respective.

**Precauți speciale pentru eliminare:** Medicamentele nu trebuie eliminate în apele uzate sau deșeurile menajere. Utilizați sistemele de returnare a oricărui produs medicinal veterinar neutilizat sau a deșeurilor provenite din acesta, în conformitate cu cerințele locale și cu sistemele naționale de colectare aplicabile. Aceste măsuri ar trebui să contribuie la protecția mediului. Solicitați medicului veterinar sau farmacistului informații referitoare la modalitatea de eliminare a medicamentelor care nu mai sunt necesare.

**Classificarea produselor medicinale veterinare**

Produs medicinal veterinar care se eliberează cu prescripție.

**Numerale autorizațiilor de comercializare și dimensiunile de ambalaj**

150374

Dimensiunile ambalajului:

Cutie de carton cu 10 plicuri x 1 dispozitiv fiecare

Cutie de carton cu 25 plicuri x 1 dispozitiv fiecare

Cutie de carton 1 aplicator și 25 plicuri x 1 dispozitiv fiecare

Cutie de carton cu 50 plicuri x 1 dispozitiv fiecare

Cutie de carton cu 100 plicuri x 1 dispozitiv fiecare

Cutie de carton 1 aplicator și 50 plicuri x 1 dispozitiv fiecare

Cutie din polietilenă cu 50 plicuri x 1 dispozitiv fiecare

Cutie din polietilenă cu 1 aplicator și 50 plicuri x 1 dispozitiv fiecare

Plic cu 10 dispozitive.

Este posibil ca nu toate dimensiunile de ambalaj să fie comercializate.

**Data ultimiei revizuirii a prospectului:** 04/2026

Informații detaliate privind acest produs medicinal veterinar sunt disponibile în Baza de Date a Uniunii privind Produsele (https://medicines.health.europa.eu/veterinary).

**Date de contact**

Detinătorul autorizației de comercializare:

Ceva Sante Animale Romania SRL, Str. Chindiei, Nr.5, Sector 4, 040185, București, România
**Date de contact pentru raportarea evenimentelor adverse suspectate:**

Ceva Santé Animale - 8 rue de Logrono - 33500 Libourne - Franța
Tel: +800 35 22 11 51 - E-mail: pharmacovigilance@ceva.com

**Prodător responsabil pentru eliberarea seriei:**

Ceva Santé Animale - Z.I. Très le Bois - 22600 Loudéac - Franța

**Alte informații**

**Farmacodinamie**

Progesteronul interacționează cu receptorii specifici intranucleari și se leagă de o secvență specifică ADN din genom și apoi inițiază transcrierea unui set specific de gene care sunt responsabile în ultimă instanță de translația acțiunii hormonale în evenimente fiziologice. Progesteronul are o acțiune de feed-back negativă asupra axei hipotalamo-hipofizară, în primul rând pe GnRH și în consecință asupra secreției de LH. Progesteronul previne creșterea hormonală din hipofiză (FSH și LH) și suprimă estrul și ovulația. La retragere, progesteronul scade dramatic într-o oră, permițînd maturarea foliculară, estrul și ovulația într-un interval scurt de timp.

**Farmacocinetică**

Progesteronul este rapid absorbit pe cale intravaginală. Progesteronul circulator este legat de proteinele sanguine. Progesteronul se leagă de proteina de legare a corticosteroidilor (CBG corticosteroid-binding globulin) și de albumină. Progesteronul este acumulat în țesuturi adipoase datorită proprietății sale lipofice și în țesuturi/organe care conțin receptori pentru progesteron. Ficatul este principalul loc al metabolizării progesteronului. Progesteronul are timpul de eliminare prin jumătățire de 3 ore, un Cmax de 5 µg/L și un Tmax de 9 ore. Principala cale de eliminare este prin fecale și calea secundară este cea urinară

**Naimenovaniye na veterinarniya lekarsven produkt**
Prid delta 1,55 g vaginalna lekarshtvostavlyaysha sistema za kravi

**Състав**

1,55 g progesteron za ustroystvo

Било триъгълно устройство с прикрепен пастмасов крайник.

**Видове животни, за които е предназначен ВАП**

Говеда (краве и юнции).

**Показания за употреба**

За контрол на естрания цикъл при краве и юнции включително:

- синхронизация на еструса при схеми с фиксирано време на изкуственото осемняване.
- синхронизация на еструса на животното донор и животното реципиент при ембриотрансфер. Да се използва в комбинация с простагландин (PGF2α или аналог).
- Индукция и синхронизация на еструса при циклиращи и нециклиращи говеда, включително при схеми с фиксирано време на изкуственото осемняване;
- При циклиращи говеда: да се използва в комбинация с простагландин (PGF2α) или аналог.
- при циклиращи и нециклиращи говеда: да се използва в комбинация с гонадотропин рилизинг хормон (GnRH) или аналог и PGF2α или аналог.
- при нециклиращи говеда: да се използва в комбинация с PGF2α или аналог и конски хорионгонадотропин (eCG).

**Противопоказания**

- Да не се използва при полово незреми юнции или женски животни с аномалии на гениталиите,
- напр. фирматични. Да не се използва по-рано от 35 дни след отеляването. Да не се използва при животни, страдащи от инфекциозни и неинфекциозни болести на половата система. Да не се прилага на бременни животни.

**Специални предупреждения**

**Специални предупреждения:** Процентът на кравите, показващи еструс определено време след третирането обикновено е по-голям отколкото този при нетретираните краве и последващата лутеална фаза е с нормална продължителност. Третирането само с progesteron обаче, според дозовия режим не е достатъчно да предизвика еструс и овулация при всички циклични женски животни. За оптимизиране на протокола е препоръчително да се определи цикличната активност на яйниците преди започване на progesteronovo лечение. Животни в лоша кондиция, дъжаща се на болести, неадекватно хранене, ненужен стрес или други фактори могат да дадат незадоволителен отговор при третирането.

**Специални предпазни мерки за безопасна употреба при видовете животни, за които е предназначен ВАП:** Не е приложимо.

**Специални предпазни мерки, които трябва да вземе мястото, прилагашо ветеринарния лекарствен продукт на животните**

Индивидуално предпазно оборудване, състоящо се от ръкавици, трябва да се носи, когато се работи с ветеринарния лекарствен продукт. Да не се яде или пие при прилагането на продукта. Измийте ръцете си след употреба.

**Бременност и лактация:** Може да се прилага по време на лактация. Да не се използва преди да са изминали 35 дни от отеляването. Лабораторните проучвания при пълкове и зайци при интрамукусно и подкожно прилагане и в повтарящи се високи дози progesteron са доказали фетотоксични ефекти. Не се прилага по време на бременност. Взаимодействие с други ветеринарни лекарствени продукти и други форми на взаимодействие: Не са известни.

**Предозирание:** Не е приложимо.

**Основни несъвместимости:** Не са известни.

**Неблагоприятни реакции**

| Говеда:                                                                                   |                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Много чести (повече от 1 на 10 третирани животни):                                        | Вагинални изтечения <sup>1,2</sup>                                                                       |
| Много редки (по-малко от 1 на 10 000 третирани животни, включително изолирани съобщения): | Възпалителна реакция в мястото на прилагане (например възпаление на стените на влагалището) <sup>3</sup> |

<sup>1</sup>Мътни вагинални секрети може да се наблюдават по време на изваждането.

<sup>2</sup>Тези леза, локална реакция преминава спонтанно без необходимост от лечение и не оказва влияние на осемняването и плодността.

Съобщаването на неблагоприятни реакции е важно. Това позволява непрекъснат мониторинг на безопасността на продукта. Ако забележите никакви неблагоприятни реакции, включително и такива, които не са описани в тази листовка или мислите, че ветеринарния лекарствен продукт не действа, свържете се първо с Вашия ветеринарен лекар. Можете също да съобщавате неблагоприятни реакции на притежателя на разрешението за търговия, като използвате данните за контакт в края на тази листовка или чрез Вашата национална система за съобщаване: https://kvmp.bfsa.bg.

**Дозировка за всеки вид животно, начини и метод на приложение**

Pack sizes

Cardboard box containing 10 sachets of 1 device  
Cardboard box containing 25 sachets of 1 device  
Cardboard box containing 1 applicator and 25 sachets of 1 device  
Cardboard box containing 50 sachets of 1 device  
Cardboard box containing 100 sachets of 1 device  
Cardboard box containing 1 applicator and 50 sachets of 1 device  
Polyethylene box containing 50 sachets of 1 device  
Polyethylene box containing 1 applicator and 50 sachets of 1 device  
Sachet containing 10 devices  
Not all pack sizes may be marketed.

**Data on which the package leaflet was last revised:** [MM/YYYY]

Detailed information on this veterinary medicinal product is available in the Union Product Database (<https://medicines.health.europa.eu/veterinary/>).

Find more product information by searching for the 'Product Information database' on [www.gov.uk](http://www.gov.uk)

**Contact details**

**Marketing Authorisation Holder and contact details to report suspected adverse reactions:**

Ceva Santé Animale - 8 rue de Logrono - 33500 Libourne - France  
Tel: +800 35 22 11 51 - E-mail: [pharmacovigilance@ceva.com](mailto:pharmacovigilance@ceva.com)  
**Manufacturer responsible for the batch release:**  
Ceva Santé Animale - Z.I. Très le Bois - 22600 Loudéac - France

**Other information**

**Pharmacodynamics:** Progesterone interacts with specific intranuclear receptors and binds to specific DNA sequence on the genome and then, initiates transcription of a specific set of genes which is ultimately responsible for the translation of hormonal action into physiological events. Progesterone has a negative feedback action on the hypothalamo-pituitary axis, primarily on GnRH and consequently on LH secretion. Progesterone prevents the hormonal surge from hypophysis (FSH and LH) and so suppresses oestrus and ovulation. At removal progesterone falls dramatically in 1 hour allowing follicular maturation, oestrus and ovulation in a narrow window.

**Pharmacokinetics:** Progesterone is rapidly absorbed by intravaginal route. Circulating progesterone is bound to proteins in blood. Progesterone binds to corticosteroid-binding globulin (CBG) and to albumin. Progesterone is accumulated in fatty tissue due to its lipophylic properties, and in tissues/organs containing progesterone receptors. Liver is the main site of progesterone metabolism. Progesterone has a half-life of 3 hours, a Cmax of 5µg/L and a Tmax of 9h. The principal route of excretion is the faeces and the secondary route is the urine.

| UK POM-V                                                     |
|--------------------------------------------------------------|
| IE <span><span></span></span> POM Prescription Only Medicine |

**For-animal treatment only.**

To be supplied only on veterinary prescription.

**Denominazione del medicinale veterinario**

Prd delta 1,55 g sistema a rilascio intra-vaginale per bovini.

**Composizione**

1,55 g di progesterone per dispositivo.

Dispositivo triangolare biancastro con coda di rimozione in plastica.

**Specie di destinazione**

Bovino (vacca e manza).

**Indicazioni per l'uso**

Per il controllo del ciclo estrale in bovine e mucca compressa:

- sincronizzazione dell'estro incluso l'utilizzo in protocolli di inseminazione artificiale a tempo fisso (FITA);

- sincronizzazione dell'estro in animali donatori o riceventi in corso di embriotransfer; da utilizzarsi in combinazione con una prostaglandina (PGF2a o analogo).

- Induzione e sincronizzazione dell'estro in bovine cicliche e non cicliche, incluso l'utilizzo in protocolli di inseminazione artificiale a tempo fisso (FITA);

- in bovine cicliche: da utilizzarsi in combinazione con una prostaglandina (PGF2a) o analogo;

- in bovine cicliche e non cicliche: da utilizzarsi in combinazione con un ormone rilasciante gonadotropina (GnRH) o analogo e PGF2a o analogo;

- in bovine non cicliche: da utilizzarsi in combinazione con una prostaglandina PGF2a o analogo e gonadotropina corionica equina (eCG).

**Controindicazioni**

Non usare in manze sessualmente immature o femmine con tratto genitale anormale es. vitelle freemartin. Non usare prima che siano trascorsi 35 giorni dal parto precedente. Non usare in animali che soffrono di malattie infettive o non infettive al tratto genitale. Non usare in animali gravidi.

**Avvertenze speciali**

**Avvertenze speciali:** La percentuale di bovine che mostra l'estro entro un dato periodo a seguito di trattamento è di solito maggiore rispetto a bovine non trattate e la successiva fase luteinica ha una durata normale. Tuttavia, il solo trattamento con progesterone, in accordo al regime di somministrazione proposto, non è sufficiente per indurre l'estro e l'ovulazione in tutte le femmine cicliche. Al fine di ottimizzare il protocollo, è consigliabile determinare il ciclo ovarico prima del trattamento con progesterone. Animali in cattive condizioni di salute, sia a causa di malattie, alimentazione inadeguata, in condizioni di stress inutile o per altri fattori, possono avere una carente risposta al trattamento.

Precauzioni speciali per l'impiego sicuro nelle specie di destinazione: Non pertinente.

**Precauzioni speciali** che devono essere prese dalla persona che somministra il medicinale veterinario agli animali: Nella manipolazione del medicinale veterinario si dovrà utilizzare una speciale attrezzatura protettiva composta da guanti. Non mangiare o bere quando si maneggia il medicinale veterinario.

Lavarsi le mani dopo l'uso.

**Gravidanza e allattamento:** Può essere usato durante l'allattamento. Non usare prima che siano trascorsi 35 giorni dal parto precedente.

Studi di laboratorio su ratti e conigli, hanno mostrato evidenza di effetti fetotossici dopo somministrazioni intramuscolari o sottocutanee e ad elevate dosi ripetute di progesterone. Non usare durante la gravidanza.

Interazione con altri medicinali veterinari e altre forme di interazione: Nessuna nota.

Sovradosaggio: Non applicabile.

Incompatibilità principali: Nessuna conosciuta.

**Restrizioni speciali per l'uso e condizioni speciali per l'impiego,** comprese le restrizioni sull'uso degli antimicrobici e dei medicinali veterinari antiparassitari allo scopo di limitare il rischio di sviluppo di resistenza: La somministrazione del medicinale deve essere effettuata esclusivamente dal medico veterinario.

**Eventi avversi**

| Molto comuni (>1 animale / 10 animali trattati)                                     | Secrezioni vaginali <sup>1,2</sup>                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Molto rari (<1 animale / 10.000 animali trattati, incluse le segnalazioni isolate): | Inflamazione al sito di applicazione (ad es. infiammazione della parete vaginale) <sup>3</sup> |

<sup>1</sup> Al momento della rimozione del dispositivo si possono osservare secrezioni vaginali torbide.

<sup>2</sup> Lieve, localizzata, scompare rapidamente senza alcun trattamento tra la rimozione e l'inseminazione e non influenza i tassi di fertilità all'inseminazione ed i tassi di gravidanza.

La segnalazione degli eventi avversi è importante poiché consente il monitoraggio continuo della sicurezza di un prodotto. Se dovessero manifestarsi effetti indesiderati, compresì quelli non menzionati in questa foglio illustrativo, o si ritiene che il medicinale non abbia funzionato, si prega di informarne in primo luogo il medico veterinario. È inoltre possibile segnalare eventuali eventi avversi al titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio o il suo rappresentante locale utilizzando i recapiti riportati alla fine di questo foglietto o tramite il sistema nazionale di segnalazione: <https://www.salute.gov.it/farmacovigilanzaveterinaria>

**Posologia per ciascuna specie, via(e) e modalità di somministrazione**

Uso intra-vaginale. 1,55 g di progesterone / animale per 7 giorni.

**La scelta del protocollo da utilizzare deve essere eseguita dal veterinario responsabile del trattamento,** sulla base degli obiettivi del trattamento stesso a livello individuale o di mandria. Possono essere utilizzati i seguenti protocolli.

**Per la sincronizzazione dell'estro (inclusa la sincronizzazione in animali donatori o riceventi in corso di embriotransfer):**

- Inserire il dispositivo per 7 giorni.
- Incolare una dose di prostaglandina (PGF2a) o analogo 24 ore prima della rimozione del dispositivo.

- Rimuovere il dispositivo.
- Negli animali che rispondono al trattamento, la comparsa dell'estro si verifica generalmente entro 1-3 giorni dopo la rimozione del dispositivo. Le bovine devono essere inseminate entro 12 ore dai primi segni estrali rilevati.

**Per l'induzione e la sincronizzazione dei calori in corso di inseminazione artificiale a tempo fisso (FITA)**

Sono stati riportati comunemente in ricerca bibliografica i seguenti protocolli FITA:

**In bovine cicliche:**

- Inserire il dispositivo per 7 giorni.
- Incolare una dose di prostaglandina (PGF2a) o analogo 24 ore prima della rimozione del dispositivo.
- Rimuovere il dispositivo.
- Gli animali devono essere inseminati 56 ore dopo la rimozione del dispositivo.

**In bovine cicliche e non cicliche (include vacche riceventi):**

- Inserire il dispositivo per 7 giorni.
- Somministrare GnRH o analogo all'inserimento del dispositivo.
- Incolare una dose di prostaglandina (PGF2a) o analogo 24 ore prima della rimozione del dispositivo.

- Gli animali devono essere inseminati 56 ore dopo la rimozione del dispositivo o, inseminare a tempo fisso da 16 a 20 ore dopo.
- O in alternativa:

- Inserire il dispositivo per 7 giorni.
- Somministrare GnRH o analogo all'inserimento del dispositivo.
- Incolare una dose di prostaglandina (PGF2a) o analogo al momento della rimozione del dispositivo.
- Incolare GnRH o analogo 56 ore dopo la rimozione del dispositivo.
- Gli animali devono essere inseminati da 16 a 20 ore dopo.

**In bovine non cicliche:**

- Inserire il dispositivo per 7 giorni.

**Incolare una dose di prostaglandina (PGF2a) e analogo, 24 ore prima della rimozione del dispositivo.**

- Incolare eCG al momento della rimozione del dispositivo.
- Gli animali devono essere inseminati 56 ore dopo la rimozione del dispositivo.

**Informazioni sulle modalità di applicazione del dispositivo:**

Usando l'applicatore, inserire un dispositivo nella vagina dell'animale. Il dispositivo intravaginale deve rimanere in loco per 7 giorni.

Il dispositivo è inteso per uso singolo.

**Raccomandazioni per una corretta somministrazione**

**Modalità d'uso ed inserimento dell'applicatore:**

Deve essere utilizzato un applicatore per la somministrazione seguendo la procedura descritta di seguito:

- Pulire e disinfettare l'applicatore mediante una soluzione antisettica non irritante prima dell'utilizzo.
- Piegare il dispositivo e inserirlo nell'applicatore. La parte terminale del dispositivo a forma di coda deve essere posizionata all'esterno dell'applicatore. Deve essere dedicata una particolare attenzione nell'evitare una manipolazione non necessaria e prolungata del prodotto al fine di minimizzare il possibile trasferimento della sostanza attiva ai guanti dell'operatore.
- Applicare una piccola quantità di lubrificante ostetrico alla parte terminale dell'applicatore.
- Solvere la coda della bovina e pulire la vulva e il perineo.
- Inserire delicatamente l'applicatore in vulva, dapprima verticalmente e poi orizzontalmente fino a che non si incontra una certa resistenza.
- Assicurarsi che la coda di rimozione del dispositivo sia libera, premere lo stantuffo dell'applicatore ed inserire il dispositivo facendo in modo che la coda di rimozione del dispositivo penzoli dalla vulva.

- Pulire e disinfettare l'applicatore dopo l'uso e prima che venga utilizzato in un altro animale.
- Rimozione: Rimuovere 7 giorni dopo l'inserimento tirando delicatamente l'apposita coda di rimozione. Nel caso in cui la coda di rimozione non sia visibile al di fuori dell'animale, questa può essere localizzata nella parte posteriore della vagina utilizzando un dito quantato. La rimozione del dispositivo non deve richiedere particolare forza. Nel caso in cui si dovesse rilevare una certa resistenza è opportuno utilizzare una mano quantata per facilitare la rimozione. Se si riscontrano ulteriori difficoltà nella rimozione è opportuno richiedere l'intervento del veterinario. La somministrazione del medicinale deve essere effettuata esclusivamente dal medico veterinario.

**Tempi di attesa:** Carni e frattaglie: zero giorni. Latte: zero ore.

**Precauzioni speciali per la conservazione:** Tenere fuori dalla vista e dalla portata dei bambini. Questo medicinale veterinario non richiede alcuna condizione particolare di conservazione. Periodo di validità dopo la prima apertura del sachetto: 6 mesi. Non usare questo

medicinale veterinario dopo la data di scadenza riportata sulla scatola e sul sachetto dopo Exp. La data di scadenza si riferisce all'ultimo giorno del mese.

**Precauzioni speciali per lo smaltimento:** I medicinali non devono essere smaltiti nelle acque di scarico o nei rifiuti domestici. Utilizzare sistemi di ritiro per lo smaltimento dei medicinali veterinari iutilizzati o dei rifiuti derivanti dall'impiego di tali medicinali in conformità delle norme locali e dei eventuali sistemi nazionali di raccolta pertinenti per il medicinale veterinario interessato. Queste misure servono a salvaguardare l'ambiente. Chiedere al proprio medico veterinario o farmacista come fare per smaltire i medicinali di cui non si ha più bisogno.

**Classificazione dei medicinali veterinari**

Medicinale veterinario soggetto a prescrizione. Da vendersi dietro presentazione di ricetta medico veterinaria non ripetibile.

**Numeri dell'autorizzazione all'immissione in commercio e confezioni**

*Confezioni*

Scatola di cartone contenente 10 sachetti da 1 dispositivo.

Scatola di cartone contenente 25 sachetti da 1 dispositivo.

Scatola di cartone contenente 100 sachetti da 1 dispositivo.

Scatola di cartone contenente 1 applicatore e 25 sachetti da 1 dispositivo.

Scatola di cartone contenente 50 sachetti da 1 dispositivo.

Scatola di cartone contenente 1 applicatore e 50 sachetti da 1 dispositivo.

Scatola in polietilene contenente 50 sachetti da 1 dispositivo.

Scatola in polietilene contenente 1 applicatore e 50 sachetti da 1 dispositivo.

Sachetto contenente 10 dispositivi.

È possibile che non tutte le confezioni siano commercializzate.

Scatola contenente 10 sachetti da 1 dispositivo A.I.C. n. 104210012

Scatola contenente 25 sachetti da 1 dispositivo A.I.C. n. 104210024

Scatola contenente 100 sachetti da 1 dispositivo A.I.C. n. 104210036

**Data dell'ultima revisione del foglietto illustrativo:** 04/2026.

Informazioni dettagliate su questo medicinale veterinario sono disponibili nella banca dati dei medicinali veterinari dell'Unione (<https://medicines.health.europa.eu/veterinary/it>).

**Recapiti**

**Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio e recapiti per la segnalazione di sospetti eventi avversi:**

Ceva Salute Animale S.p.A. - Via dei Valtorta 48 - 20127 Milano, Italia.  
Tel: 0800 35 22 11 51 - E-mail: [pharmacoviglanza-italia@ceva.com](mailto:pharmacoviglanza-italia@ceva.com)  
**Fabbricante responsabile del rilascio del lotto:**  
Eva Santé Animale - Z.I. Très le Bois - 22600 Loudéac – Francia.

**Altre informazioni**

**Farmacodinamica:** Il progesterone interagisce con specifici recettori intranucleari e si lega alla sequenza specifica del DNA sul genoma e poi, inizia la trascrizione di uno specifico gruppo di geni che è essenzialmente responsabile per la traduzione dell'azione ormonale in eventi fisiologici. Il progesterone ha un feedback negativo sull'asse ipotalamo-ipofisi, principalmente su GnRH e di conseguenza sulla secrezione LH. Il progesterone inibisce la secrezione ormonale da parte dell'ipofisi (FSH e LH) e come conseguenza sopprime l'estro e l'ovulazione. Alla rimozione, il progesterone decade drasticamente nel giro di 1 ora permettendo la maturazione follicolare, l'estro e l'ovulazione in un tempo ristretto.

**Farmacocinetica:** Il progesterone è rapidamente assorbito per via intra-vaginale. Il progesterone circolante è legato alle proteine nel sangue. Il progesterone si lega alla globulina legante i corticosteroidi (CBG) e all'albumina. Il progesterone si accumula nel tessuto adiposo a causa delle sue proprietà lipofile, e nei tessuti/organi contenenti recettori per il progesterone. Il fetgato è il principale organo metabolizzante il progesterone. Il progesterone ha un'emivita di 3 ore, un Cmax di 5 µg/L e un Tmax di 9 ore. La principale via di escrezione sono le feci e secondariamente le urine.

**Denominación del medicamento veterinario**

Prd delta 1,55 g sistema de liberación vaginal para bovino

**Composición**

1,55 g de progesterona por dispositivo.

Dispositivo triangular blanquecino con un cordón de plástico.

**Especies de destino**

Bovino (vacas y novillas).

**Indicaciones de uso**

Para el control del ciclo estral en vacas y novillas incluyendo:

- sincronización del ciclo incluyendo protocolos de inseminación a tiempo fijo (IATF);

- sincronización del celo en animales donantes y receptores para transferencia embrionaria: Para ser usado en combinación con una prostaglandina (PGF2a o análogo).

- Inducción y sincronización del celo en hembras cíclicas y no cíclicas, incluyendo protocolos de inseminación a tiempo fijo (IATF);

- en hembras cíclicas: para ser usado en combinación con una prostaglandina PGF2a o análogo;

- en hembras cíclicas y no cíclicas: para ser usado en combinación con la hormona liberadora de gonadotropina (GnRH) o análogo y PGF2a o análogo;

- en hembras no cíclicas: para ser usado en combinación con PGF2a o análogo y gonadotropina coriónica equina (eCG).

**Contraindicaciones**

No utilizar en novillas sexualmente inmaduras o en hembras con tracto genital anómalo, por ejemplo freemartins. No utilizar antes de que hayan pasado 35 días desde la fecha del parto anterior. No utilizar en animales que presenten infección o enfermedad no infecciosa del tracto genital. No utilizar en hembras gestantes.

**Advertencias especiales**

**Advertencias especiales.** El porcentaje de vacas que muestran estro dentro de un periodo dado después del tratamiento es por lo general mayor que en las vacas no tratadas y la fase lútea posterior es de duración normal. No obstante, el tratamiento sólo con progesterona, en base al régimen de dosificación propuesto, no es suficiente para inducir el celo y la ovulación en todas las hembras cíclicas. Con objeto de optimizar el protocolo, es aconsejable determinar la actividad ovárica cíclica antes de usar el tratamiento con progesterona. Los animales que se encuentren en malas condiciones, ya sea por enfermedad, alimentación inadecuada, sometidos a estrés innecesario u otros factores, pueden responder mal al tratamiento.

**Precauciones especiales** para una utilización segura en las especies de destino: No procede. **Precauciones específicas**, que debe tomar la persona que administre el medicamento veterinario a los animales: Debe utilizarse equipo de protección individual consistente en guantes cuando se manipule el medicamento veterinario. No comer ni beber mientras se manipula el medicamento veterinario. Lavar las manos después de su manipulación.

**Gestación y lactancia:** Puede utilizarse durante la lactancia. No utilizar antes de que hayan pasado 35 días desde el parto anterior. Los estudios de laboratorio efectuados en ratas y conejos, tras administración de dosis elevadas y repetidas de progesterona, por vía intramuscular o subcutánea, han demostrado efectos tóxicos para el feto. No usar durante la gestación.

Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción: Ninguna conocida.

**Sobredosificación (síntomas, medidas de urgencia, antidotos):** No procede.

**Restricciones y condiciones especiales de uso:** Medicamento administrado bajo el control o supervisión del veterinario.

**Incompatibilidades principales:** Ninguna conocida.

**Acontecimientos adversos**

| Muy frecuentes (>1 animal por cada 10 animales tratados):                             | Descarga vaginal <sup>1,2</sup>                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Muy raros (<1 animal por cada 10.000 animales tratados, incluidos informes aislados): | Inflamación en el lugar de aplicación (es decir inflamación de la pared vaginal) <sup>3</sup> |

<sup>1</sup> Pueden observarse secreciones vulvares turbias en el momento de la retirada del dispositivo.

<sup>2</sup> Lieve, locales y de rápida desaparición sin necesidad de tratamiento entre la retirada y la inseminación, y no afectan ni a la fertilidad en las inseminaciones ni a las tasas de gestación.

<sup>3</sup> No utilizar una prostaglandina (PGF2a) o análogo 24 horas antes de la retirada del dispositivo.

La decisión sobre el protocolo a utilizar debe tomarla el veterinario responsable del tratamiento, en base a los objetivos de tratamiento del rebaño o de la vaca a nivel individual. Pueden seguirse los siguientes protocolos.

**Para la sincronización del celo (incluyendo la sincronización del celo de animales donantes y receptores para transferencia embrionaria):**

- Insertar el dispositivo durante 7 días.
- Inyectar una prostaglandina (PGF2a) o análogo 24 horas antes de la retirada del dispositivo.
- Retirada del dispositivo.

- En los animales que responden al tratamiento, el inicio del celo generalmente ocurre entre 1-3 días después de la extracción del dispositivo. Las vacas deben ser inseminadas en las 12 horas del primer celo observado.

**Para la inducción y sincronización del celo para Inseminación Artificial a Tiempo Fijo (IATF):**

En informes publicados encontramos los siguientes protocolos de IATF:

**En hembras cíclicas:**

- Insertar el dispositivo durante 7 días.
- Inyectar una prostaglandina (PGF2a) o análogo 24 horas antes de la retirada del dispositivo.
- Retirada del dispositivo.
- En los animales que responden al tratamiento, el inicio del celo generalmente ocurre entre 1-3 días después de la extracción del dispositivo. Las vacas deben ser inseminadas en las 12 horas del primer celo observado.

**Para la inducción y sincronización del celo para Inseminación Artificial a Tiempo Fijo (IATF):**

En informes publicados encontramos los siguientes protocolos de IATF:

**En hembras cíclicas:**

- Insertar el dispositivo durante 7 días.
- Inyectar una prostaglandina (PGF2a) o análogo 24 horas antes de la retirada del dispositivo.
- Retirada del dispositivo.
- Inseminar los animales 56 horas después de la retirada del dispositivo.

**En hembras cíclicas y no cíclicas (incluyendo vacas receptoras):**

- Insertar el dispositivo durante 7 días.
- Inyectar GnRH o análogo al colocar el dispositivo.
- Inyectar una prostaglandina (PGF2a) o análogo 24 horas antes de la retirada del dispositivo.
- Inseminar los animales 16 a 20 horas después.

**En hembras no cícliche:**

- Insertar el dispositivo durante 7 días.
- Inyectar una prostaglandina (PGF2a) o análogo 24 horas antes de la retirada del dispositivo.
- Inyectar eCG a la retirada del dispositivo.
- Inseminar los animales 56 horas después de la retirada del dispositivo.

**Información sobre la aplicación del dispositivo:**

Con la ayuda de un aplicador, insertar un dispositivo en la vagina del animal. El dispositivo intravaginal deberá permanecer colocado durante 7 días. El dispositivo está destinado a un

**Instrucciones para una correcta administración**

Utilización del aplicador e inserción:

El aplicador utilizado para la administración del dispositivo be utilizarse siguiendo el procedimiento que se describe a continuación:

- Antes del uso limpiar y desinfectar el aplicador con una solución antiséptica no irritante.
- Doble el dispositivo antes de insertarlo en el aplicador. Asegúrese de que el cordón del dispositivo esté fuera del aplicador. Evite la manipulación innecesaria o prolongada del dispositivo para minimizar la transferencia de sustancia activa a los guantes del operad.
- Aplique una pequeña cantidad de lubricante obstétrico al extremo distal del aplicador cargado.
- Levante la cola y limpie la vulva y el perineo.
- Inserte suavemente el aplicador en la vagina, primero en dirección vertical y luego horizontalmente hasta encontrar alguna resistencia.
- Asegúrese de que el cordón para la retirada esté libre, presione el mango del aplicador y extráigalo, dejando el cordón del dispositivo colgando de la vulva.
- Limpie y desinfecte el aplicador después de usarlo y antes de usarlo en otro animal.

Siete días después de su colocación, retire el dispositivo tirando suavemente del cordón. En ocasiones puede que el cordón no sea visible desde el exterior del animal, en tales casos si se encuentre en la parte posterior de la vagina puede retirarlo con un dedo enguantado. La retirada del dispositivo no debe requerir fuerza. Si se encuentra alguna resistencia, se debe usar una mano enguantada para facilitar la extracción.

Si hay alguna dificultad en la extracción del dispositivo del animal, más allá de lo detallado

anteriormente, consulte con el veterinario.

**Tempos de espera:** Carne: cero días. Leche: cero horas.

**Precauzioni speciali per la conservazione:** Mantenere fuori della vista e al alcance de los niños. Este medicamento veterinario requiere condiciones especiales de conservación. Periodo de validez después de abierto el sobre: 6 meses. No usar este medicamento veterinario después de la fecha de caducidad (Exp) que figura en la caja y en el sobre después de Exp. La fecha de caducidad se refiere al último día del mes indicado.

**Precauciones especiales para la eliminación:** Los medicamentos no deben ser eliminados vertiéndolos en aguas residuales o mediante los vertidos domésticos. Utilice sistemas de retirada de medicamentos veterinarios para la eliminación de cualquier medicamento veterinario no utilizado o los residuos derivados de su uso de conformidad con las normativas locales y con los sistemas nacionales de retirada aplicables. Estas medidas están destinadas a proteger el medio ambiente. Pregunte a su veterinario o farmacéutico cómo debe eliminar los medicamentos que ya no necesita.

**Clasificación de los medicamentos veterinarios**

|                                                                                                                             |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| NOTICE PRID DELTA I,55G<br>UK IT ES EL CY PT RO BG<br>700x500/FP I40x125<br>CODE ARTICLE : A2857-05<br>RECTO/VERSO<br>BLACK | PRID DELTA I,55G<br>UK IT ES EL CY PT RO BG<br><br>ID : 89763<br><br>CORPS : 10 pts |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|

LESLIE 29/07/26 - 21/08/26