

Soluzione iniettabile per bovini, suini e cavalli
Solución inyectable para bovino, porcino y equino
Oldatos injekció, szarvasmarhának, sertéseknek, lovaknak



Meloxidyl®

20 mg/ml

Denominazione del medicinale veterinario

Meloxidyl® 20 mg/ml soluzione iniettabile per bovini, suini e cavalli.

IT

Composizione: Un ml contiene:

Sostanza attiva: Meloxicam: 20 mg.

Eccipienti: Etanolo anidro: 150 mg.

Soluzione limpida da incolore a giallina.

Specie di destinazione: Bovino, suino e cavallo.



Indicazioni per l'uso: **Bovino:** Da usare nelle infezioni respiratorie acute in associazione con un'appropriate terapia antibiotica per ridurre i segni clinici nei bovini. Da usare in caso di diarrea, in associazione con una terapia reidratante per via orale per ridurre i segni clinici nei vitelli di età superiore ad una settimana e nei bovini giovani non in lattazione. Come terapia associata nel trattamento delle mastiti acute, in combinazione con una terapia antibiotica. Per il sollievo dal dolore post-operatorio a seguito di decornazione nei vitelli.

Suino: Da usare nei disturbi locomotori non infettivi per ridurre i sintomi di claudicazione ed infiammazione. Come terapia di supporto associata ad un appropriato trattamento antibiotico nella setticemia e tossiemia puerperale (sindrome mastite-metrite-agalassia).

Cavallo: Da usare nell'attenuazione dell'infiammazione e del dolore nei disturbi muscolo-scheletrici sia acuti sia cronici. Per l'attenuazione del dolore associato alla colica del cavallo.

Controindicazioni: Non usare in cavalli di età inferiore a 6 settimane. Non usare in animali con compromessa funzionalità epatica, cardiaca o renale e affetti da disturbi della coagulazione sanguigna, o quando vi siano lesioni ulcerose gastrointestinali. Non usare in casi di ipersensibilità alla sostanza attiva o a uno degli eccipienti. Per il trattamento della diarrea nei bovini, non usare in animali di età inferiore ad una settimana.

Avvertenze speciali: Il trattamento dei vitelli con il medicinale veterinario 20 minuti prima della decornazione riduce il dolore post-operatorio. Il medicinale veterinario in monoterapia non fornisce un adeguato sollievo dal dolore durante la procedura di decornazione. Per ottenere un adeguato sollievo dal dolore durante l'intervento chirurgico è necessaria la co-somministrazione di un analgesico appropriato.

Precauzioni speciali per l'impiego sicuro nelle specie di destinazione: Evitare l'uso in animali molto disidratati, ipovolemici o ipotensi che richiedono una reidratazione parenterale, poiché esiste il potenziale rischio di tossicità renale. Nel caso di un'attenuazione insufficiente del dolore quando utilizzato nel trattamento della colica del cavallo, si deve eseguire una rivalutazione attenta della diagnosi, poiché questo potrebbe indicare la necessità di un intervento chirurgico. **Precauzioni speciali che devono essere prese dalla persona che somministra il medicinale veterinario agli animali:** L'autoiniezione accidentale può causare dolore. Le persone con nota ipersensibilità ai farmaci antinfiammatori non steroidei (FANS) devono evitare contatti con il medicinale veterinario. In caso di autoiniezione accidentale, rivolgersi immediatamente ad un medico mostrandogli il foglio illustrativo o l'etichetta. Questo medicinale veterinario può causare irritazione oculare. In caso di contatto con gli occhi, sciacquare immediatamente abbondantemente con acqua. **Gravidanza e allattamento:** Bovino e suino: Può essere usato durante la gravidanza e l'allattamento. Cavallo: Non usare in cavalle in gravidanza o allattamento. **Interazione con altri medicinali veterinari e altre forme di interazione:** Non somministrare in associazione con farmaci glucocorticosteroidi, con altri farmaci antinfiammatori non steroidei o con agenti anticoagulanti. **Sovradosaggio:** In caso di sovradosaggio si deve ricorrere ad un trattamento sintomatico. **Incompatibilità principali:** Nessuna nota.

Eventi avversi: Bovino:

Molto rari (<1 animale / 10 000 animali trattati, incluse le segnalazioni isolate):

Gonfiore al sito di inoculo¹, Reazione anafilattoide²

¹ A seguito di somministrazione sottocutanea: lieve e transitorio.

² Può essere grave (anche fatale) e dovrebbe essere trattata in modo sintomatico.

Suino:

Molto rari (<1 animale / 10 000 animali trattati, incluse le segnalazioni isolate):

Reazione anafilattoide¹

¹ Può essere grave o fatale e dovrebbe essere trattata in modo sintomatico.

Cavallo:

Molto rari (<1 animale / 10 000 animali trattati, incluse le segnalazioni isolate):

Gonfiore al sito di inoculo¹, Reazione anafilattoide²

¹ Transitorio, osservato in casi isolati in studi clinici.

² Può essere grave (anche fatale) e dovrebbe essere trattata in modo sintomatico.

Se dovessero manifestarsi eventi avversi, il trattamento deve essere interrotto e si deve consultare il medico veterinario.

La segnalazione degli eventi avversi è importante poiché consente il monitoraggio continuo della sicurezza di un prodotto. Se dovessero manifestarsi effetti indesiderati, compresi quelli non menzionati in questo foglietto illustrativo, o si ritiene che il medicinale non abbia funzionato, si prega di informarne in primo luogo il medico veterinario. È inoltre possibile segnalare eventuali eventi avversi al titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio o il suo rappresentante locale utilizzando i recapiti riportati alla fine di questo foglietto o tramite il sistema nazionale di segnalazione: <https://www.salute.gov.it/farmacovigilanzaveterinaria>

Posologia per ciascuna specie, via(e) e modalità di somministrazione

Bovino: Una singola iniezione per via sottocutanea o endovenosa alla dose di 0,5 mg di meloxicam/kg di peso corporeo (cioè 2,5 ml/100 kg di peso corporeo) in associazione con una terapia antibiotica o con una terapia reidratante orale, in relazione alle esigenze.

Suino: Una singola iniezione per via intramuscolare alla dose di 0,4 mg di meloxicam/kg di peso corporeo (cioè 2,0 ml/100 kg di peso corporeo) in associazione con un'adeguata terapia antibiotica. Se necessario, una seconda somministrazione di meloxicam può essere effettuata dopo 24 ore.

Cavallo: Una singola iniezione per via endovenosa alla dose di 0,6 mg di meloxicam/kg di peso corporeo (cioè 3,0 ml/100 kg di peso corporeo). Per l'impiego nell'attenuazione dell'infiammazione e del sollievo del dolore dei disturbi muscolo-scheletrici sia acuti che cronici, la sospensione orale può essere usata per continuare il trattamento ad un dosaggio di 0,6 mg di meloxicam/kg peso corporeo, 24 ore dopo la somministrazione dell'iniezione.

Raccomandazioni per una corretta somministrazione: Evitare l'introduzione di sostanze contaminanti durante l'uso. Per assicurare un corretto dosaggio, determinare il peso corporeo con la massima accuratezza possibile. Si raccomanda di utilizzare un'apparecchiatura di misurazione opportunamente calibrata.

Tempi di attesa: **Bovino:** carni e frattaglie: 15 giorni. Latte: 5 giorni. **Suino:** carni e frattaglie: 5 giorni. **Cavallo:** carni e frattaglie: 5 giorni.

Uso non autorizzato in cavalle che producono latte per il consumo umano.

Precauzioni speciali per la conservazione: Tenere fuori dalla vista e dalla portata dei bambini. Questo medicinale veterinario non richiede alcuna condizione particolare di conservazione. Non usare questo medicinale veterinario dopo la data di scadenza riportata sulla scatola e sul flacone dopo Exp. La data di scadenza si riferisce all'ultimo giorno del mese. Periodo di validità dopo la prima apertura del confezionamento primario: 28 giorni.

Precauzioni speciali per lo smaltimento: I medicinali non devono essere smaltiti nelle acque di scarico o nei rifiuti domestici. Utilizzare sistemi di ritiro per lo smaltimento dei medicinali veterinari inutilizzati o dei rifiuti derivanti dall'impiego di tali medicinali in conformità delle norme locali e di eventuali sistemi nazionali di raccolta pertinenti per il medicinale veterinario interessato. Queste misure servono a salvaguardare l'ambiente.

Classificazione dei medicinali veterinari: Medicinale veterinario soggetto a prescrizione. Da vendersi dietro presentazione di ricetta medico veterinaria non ripetibile.

Numeri dell'autorizzazione all'immissione in commercio e confezioni: EU/2/06/070/005 - Flacone da 50 ml NIN 103945059. EU/2/06/070/006 - Flacone da 100 ml NIN 103945061. EU/2/06/070/007 - Flacone da 250 ml NIN 103945073.

Confezioni: Scatola di cartone con 1 flacone di vetro incolore da 50 ml, 100 ml o 250 ml. Ogni flacone è chiuso con un tappo di gomma bromotulica e sigillato con capsula di alluminio. È possibile che non tutte le confezioni siano commercializzate.

Data dell'ultima revisione del foglietto illustrativo: 01/2026

Informazioni dettagliate su questo medicinale veterinario sono disponibili nella banca dati dei medicinali veterinari dell'Unione (<https://medicines.health.europa.eu/veterinary/it>).

Recapiti: Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio e recapiti per la segnalazione di sospetti eventi avversi:

Ceva Santé Animale, 8 rue de Logrono, 33500 Libourne, Francia. Tel: +800 35 22 11 51 - E-mail: pharmacovigilance@ceva.com

Fabbricante responsabile del rilascio dei lotti: Ceva Santé Animale, 10 av. de La Ballastière, 33500 Libourne, Francia.

ES

Denominación del medicamento veterinario

Meloxidyl® 20 mg/ml solución inyectable para bovino, porcino y equino

Composición: Cada ml contiene:

Principios activos: Meloxicam: 20 mg.

Eccipientes: Etanol anhidro 150 mg.

Solución transparente incolora a amarillenta.

Especies de destino: Bovino, porcino y equino.



Indicaciones de uso: **Bovino:** En infecciones respiratorias agudas con terapia antibiótica adecuada para reducir los síntomas clínicos en bovino. En diarrea en combinación con terapia reidratante oral para reducir los síntomas clínicos en terneros de más de una semana y en terneros rumiantes. Como terapia auxiliar en el tratamiento de la mamiitis aguda, en combinación con terapia antibiótica. Para el alivio del dolor postoperatorio consecutivo al descornado en terneros.

Porcino: En trastornos no infecciosos del aparato locomotor para reducir los síntomas de cojera e inflamación. Como terapia auxiliar en el tratamiento de la septicemia y la toxemia puerperal (síndrome mamiitis-metritis-agalaxia) con terapia antibiótica adecuada.

Equino: Para aliviar la inflamación y el dolor en trastornos músculo-esqueléticos agudos y crónicos. Para el alivio del dolor asociado al cólico equino.

Contraindicaciones: No usar en equinos de menos de 6 semanas. No usar en animales con disfunción hepática, cardíaca o renal y trastornos hemorrágicos, o en caso de que exista evidencia de lesiones gastrointestinales ulcerogénicas. No usar en casos de hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los excipientes. Para el tratamiento de la diarrea en bovino, no usar en animales de menos de una semana.

Advertencias especiales: El tratamiento de los terneros con el medicamento veterinario 20 minutos antes del descornado reduce el dolor postoperatorio. El medicamento veterinario por sí solo no proporcionará un alivio adecuado del dolor durante el procedimiento de descornado. Para obtener un alivio adecuado del dolor durante la cirugía es necesaria una co-medición con un analgésico apropiado. **Precauciones especiales para una utilización segura en las especies de destino:** Evitar su uso en animales severamente deshidratados, hipovolémicos o hipotensos que requieran rehidratación parenteral, ya que puede existir un riesgo potencial de toxicidad renal. En caso de un alivio inadecuado del dolor en el tratamiento del cólico equino, deberá hacerse una cuidadosa reevaluación del diagnóstico, ya que esto podría indicar la necesidad de una intervención quirúrgica. **Precauciones específicas que debe tomar la persona que administre el medicamento veterinario a los animales:** La autoinyección accidental puede llegar a producir dolor. Las personas con hipersensibilidad conocida a los AINEs deberán evitar todo contacto con el medicamento veterinario. En caso de autoinyección accidental, consulte con un médico inmediatamente y muéstrelle el texto del prospecto o la etiqueta. Este medicamento veterinario puede causar irritación ocular. En caso de contacto con los ojos, enjuagar inmediatamente con abundante agua. **Gestación y lactancia:** Bovino y porcino: Puede utilizarse durante la gestación y la lactancia. Equino: No utilizar en yeguas durante la gestación o lactancia. **Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción:** No administrar simultáneamente con glucocorticosteroides, otros antiinflamatorios no esteroideos, ni con anticoagulantes. **Sobredosificación:** En caso de sobredosificación, debe iniciarse un tratamiento sintomático. **Incompatibilidades principales:** Ninguna conocida.

Acontecimientos adversos: **Bovino:**

Muy raros (<1 animal por cada 10 000 animales tratados, incluidos informes aislados):

Hinchazón en el punto de inyección¹, Reacción anafilácticoide²

¹Tras la administración subcutánea: ligera y transitoria. ²Puede ser grave (incluso mortal) y deberá ser tratada sintomáticamente.

Porcino:

Muy raros (<1 animal por cada 10 000 animales tratados, incluidos informes aislados):

Reacción anafilácticoide¹

¹Puede ser grave (incluso mortal) y deberá ser tratada sintomáticamente.

Equino:

Muy raros (<1 animal por cada 10 000 animales tratados, incluidos informes aislados):
Hinchazón en el punto de inyección ¹ , Reacción anafiláctoides ²

¹Tras la administración subcutánea: ligera y transitoria.

²Puede ser grave (incluso mortal) y deberá ser tratada sintomáticamente.

En caso de que se produzcan reacciones adversas, se deberá interrumpir el tratamiento y consultar con un veterinario. La notificación de acontecimientos adversos es importante. Permite la vigilancia continua de la seguridad de un medicamento veterinario. Si observa algún efecto secundario, incluso aquellos no mencionados en este prospecto, o piensa que el medicamento no ha sido eficaz, póngase en contacto, en primer lugar, con su veterinario. También puede comunicar los acontecimientos adversos al titular de la autorización de comercialización utilizando los datos de contacto que encontrará al final de este prospecto, o mediante su sistema nacional de notificación: Tarjeta verde: http://bit.ly/tarjeta_verde o NOTIFICAVET: <https://sinaem.aemps.es/fvvet/NotificaVet/>

Posología para cada especie, modo y vías de administración: **Bovino:** Inyección única subcutánea o intravenosa de una dosis de 0,5 mg de meloxicam/kg peso vivo (equivalente a 2,5 ml/100 kg peso vivo) en asociación con terapia antibiótica o con terapia rehidratante oral, según se considere adecuado.

Porcino: Inyección única intramuscular de una dosis de 0,4 mg de meloxicam/kg peso vivo (equivalente a 2,0 ml/100 kg peso vivo) en asociación con terapia antibiótica, según se considere adecuado. En caso necesario, se puede administrar una segunda dosis de meloxicam después de 24 horas.

Equino: Inyección única intravenosa de una dosis de 0,6 mg de meloxicam/kg peso vivo (equivalente a 3,0 ml/100 kg peso vivo). Para uso en el alivio de la inflamación y el dolor en trastornos músculo-esqueléticos agudos y crónicos, la suspensión oral puede utilizarse como continuación del tratamiento a una dosis de 0,6 mg de meloxicam/kg peso vivo, 24 horas después de la administración de la inyección.

Instrucciones para una correcta administración: Evitar la introducción de contaminación durante el uso. Debe determinarse el peso de los animales con la mayor exactitud posible para garantizar una dosificación correcta. Se recomienda el uso de equipos de medición calibrados correctamente.

Tiempos de espera: **Bovino:** Carne: 15 días; Leche: 5 días. **Porcino:** Carne: 5 días. **Equino:** Carne: 5 días

Su uso no está autorizado en animales cuya leche se utiliza para el consumo humano.

Precauciones especiales de conservación: Mantener fuera de la vista y el alcance de los niños. Este medicamento veterinario no requiere condiciones especiales de conservación. No usar este medicamento veterinario después de la fecha de caducidad que figura en la caja y en el vial después de Exp. La fecha de caducidad se refiere al último día del mes indicado. Período de validez después de abierto el envase: 28 días.

Precauciones especiales para la eliminación: Los medicamentos no deben ser eliminados vertiéndolos en aguas residuales o mediante los vertidos domésticos. Utilice sistemas de retirada de medicamentos veterinarios para la eliminación de cualquier medicamento veterinario no utilizado o los residuos derivados de su uso de conformidad con las normativas locales y con los sistemas nacionales de retirada aplicables. Estas medidas están destinadas a proteger el medio ambiente.

Clasificación de los medicamentos veterinarios: Medicamento sujeto a prescripción veterinaria.

Números de autorización de comercialización y formatos: EU/2/06/070/005 - EU/2/06/070/006 - EU/2/06/070/007

Formatos: Caja de cartón con un frasco de vidrio incoloro de 50 ml, 100 ml o 250 ml. Cada vial está cerrado con un tapón de goma de bromobutilo y sellado con una cápsula de aluminio. Es posible que no se comercialicen todos los formatos.

Fecha de la última revisión del prospecto: 01/2026

Encontrará información detallada sobre este medicamento veterinario en la Base de Datos de Medicamentos de la Unión (<https://medicines.health.europa.eu/veterinary>).

Datos de contacto:

Titular de la autorización de comercialización y datos de contacto para comunicar las sospechas de acontecimientos adversos:

Ceva Santé Animale, 8 rue de Logrono, 33500 Libourne, Francia

Tel: +800 35 22 11 51 - E-mail: pharmacovigilance@ceva.com

Fabricante responsable de la liberación del lote: Ceva Santé Animale, 10 av. de La Ballastière, 33500 Libourne, Francia

(HU)

Az állatgyógyászati készítmény neve

Meloxidyl® 20 mg/ml oldatos injekció, szarvasmarháknek, sertéseknek, lovaknak

Összetétel: Milliliterenként tartalmaz:

Hatóanyagok: Meloxicám 20 mg

Segédanyagok: Vízmentes etanol 150 mg

Tiszta, szintelen-sárgás színű oldat.

Célállat fajok: Szarvasmarha, sertés, ló.



Terápiás javallatok: **Szarvasmarha:** Szarvasmarha akut légzőszervi fertőzéseinek kezelésére, megfelelő antibiotikum terápiával kombinálva, a klinikai tünetek csökkentése céljából. Hasmenéses megbetegedésekben szájon át alkalmazott folyadékterápiával együtt, borjaknál (egy hetes kortól), és növendék, nem tejelő állatoknál, a klinikai tünetek csökkentése céljából. Akut tőgygyulladás kiegészítő kezelésére, antibiotikum terápiával kombinálva. Borjak szarvtalanítását követő, műtét utáni fájdalom csillapítására.

Sertés: Nem fertőző kóroktanú mozgásszervi megbetegedések esetén a sántaság és a gyulladás tüneteinek csökkentésére. Puerperális szepsziskémia és toxémia (MMA-szindróma, mastitis-metritis-agalactia) kiegészítő kezelésére, megfelelő antibiotikum terápia mellett.

Ló: Gyulladás csökkentésére és fájdalom csillapítására akut és krónikus mozgásszervi rendellenességek esetén. Fájdalom enyhítésére lovak kólikája esetén.

Ellenjavallatok: Nem adható 6 hetesnél fiatalabb csikóknak. Nem alkalmazható máj-, szív- és vesebetegségek, illetve vérzéssel járó kórképek esetén, valamint olyan állatoknál, amelyeknél gyomor- illetve bélrendszeri fekélyre utaló tünetek jelentkeztek. Nem alkalmazható a hatóanyaggal vagy bármely segédanyaggal szembeni túlérzékenység esetén. Nem adható 1 hetesnél fiatalabb állatoknak, a szarvasmarha hasmenéses megbetegedéseinek kezelésére során.

Különleges figyelmeztetések: A borjak szarvtalanítása előtt 20 perccel adva, az állatgyógyászati készítménnyel végzett kezelés csökkenti a műtét utáni fájdalmat. Az önmagában alkalmazott állatgyógyászati készítmény nem nyújt megfelelő fájdalomcsillapító hatást a szarvtalanítási beavatkozáshoz. A műtét alatti fájdalommentesség eléréséhez megfelelő fájdalomcsillapító szer együttes alkalmazása szükséges. **Különleges óvintézkedések:** A célállatfajokon való biztonságos alkalmazáshoz: A vesekárosodás fokozott kockázata miatt kerülni kell a készítmény alkalmazását súlyosan dehidrált, hipovolémiás vagy hipotóniás állatoknál, melyeknél parenterális folyadékpótlás szükséges. Lovak kólikája kezelésekor, nem kielégítő fájdalomcsillapító hatás esetén körültekintően felül kell vizsgálni a diagnózist, mivel ez a sebési beavatkozás szükségességét vetheti fel. **Az állatok kezelését végző személyre vonatkozó különleges óvintézkedések:** A véletlen önjekciózás fájdalmas lehet. Nem szteroid gyulladáscsökkentő szerekkel (NSAIDs) szembeni ismert túlérzékenység esetén kerülni kell az állatgyógyászati készítménnyel való érintkezést. Véletlen önjekciózás esetén haladéktalanul orvoshoz kell fordulni, bemutatva a készítmény használati utasítását vagy címkéjét. Ez az állatgyógyászati készítmény szemirritációt okozhat. Szembe kerülés esetén azonnal vízzel alaposan ki kell öblíteni. **Vemhesség és laktáció:** Szarvasmarha és sertés: Vemhesség és laktáció idején alkalmazható. Ló: Nem adható vemhes vagy laktáló kancáknak. **Gyógyszerköölcsönhatás és egyéb interakciók:** Nem alkalmazható egyidejűleg glükokortikoidokkal, más nem szteroid gyulladásgátlókkal vagy vérálvadásgátlókkal. **Túladagolás:** Túladagolás esetén tüneti kezelést kell alkalmazni. **Főbb inkompatibilitások:** Nem ismert.

Mellékhatások: **Szarvasmarha:**

Nagyon ritka (10 000 kezelt állatból kevesebb mint 1-nél jelentkezik, beleértve az izolált eseteket is):
Duzzanat az injekció beadásának helyén ¹ , Anaphylaxiás jellegű reakció ²

¹ Szubkután alkalmazást követően: enyhe és átmeneti.

² Súlyosak (akár végzetesek) lehetnek, tüneti kezelést kell alkalmazni.

Sertés:

Nagyon ritka (10 000 kezelt állatból kevesebb mint 1-nél jelentkezik, beleértve az izolált eseteket is):
Anaphylaxiás jellegű reakció ¹

¹ Súlyosak (akár végzetesek) lehetnek, tüneti kezelést kell alkalmazni.

Ló:

Nagyon ritka (10 000 kezelt állatból kevesebb mint 1-nél jelentkezik, beleértve az izolált eseteket is):
Duzzanat az injekció beadásának helyén ¹ , Anaphylaxiás jellegű reakció ²

¹ Átmeneti, izolált esetekben figyelték meg a klinikai vizsgálatok során.

² Súlyosak (akár végzetesek) lehetnek, tüneti kezelést kell alkalmazni.

Amennyiben mellékhatások jelentkeznek, a kezelést abba kell hagyni, és értesíteni kell a kezelő állatorvost.

Fontos a mellékhatások bejelentése. Ez lehetővé teszi a készítmény biztonságosságának folyamatos nyomon követését. Ha bármilyen mellékhatást észlel, még ha az nem is szerepel ebben a használati utasításban, vagy úgy gondolja, hogy a készítmény nem hatott, értesítse erről a kezelő állatorvost! A mellékhatásokat a forgalombahozatali engedély jogosultjának is bejelentheti a jelen használati utasítás végén található elérhetőségeken vagy a nemzeti mellékhatás figyelő rendszeren (<https://portal.nebih.gov.hu/-/pharmacovigilance>) keresztül.

Adagolás állatfajok szerint, az alkalmazás módszere és módja

Szarvasmarha: Egyszeri alkalommal 0,5 mg meloxicám/ttkg (azaz 2,5 ml/100 ttkg), szubkután vagy intramuszkulárisan alkalmazva, szükség szerint antibiotikum terápiával vagy szájon át adott folyadékpótlással kombinálva.

Sertés: Egyszeri alkalommal 0,4 mg meloxicám/ttkg (azaz 2,0 ml/100 ttkg), intramuszkulárisan alkalmazva, szükség szerint antibiotikum terápiával kombinálva. Amennyiben szükséges, a meloxicám alkalmazása 24 óra múlva megismételhető.

Ló: Egyszeri intravénás injekció formájában 0,6 mg meloxicám/ttkg (azaz 3,0 ml/100 ttkg). Akut és krónikus mozgásszervi rendellenességek esetén a gyulladás és a fájdalom csillapítására a kezelés folytatásaként orális szuszpenzió alkalmazható 0,6 mg meloxicám/ttkg adagban, az injekció beadása után 24 órával.

A helyes alkalmazásra vonatkozó útmutatás: A megfelelő adagolás érdekében a testtömeget a lehető legpontosabban kell meghatározni. Megfelelően kalibrált mérőeszköz használata javasolt. Kerülni kell, hogy használat során szennyeződés jusson a készítménybe.

Élelmezés-egészségügyi várakozási idő: **Szarvasmarha:** Hús és egyéb ehető szövetek: 15 nap, Tej: 5 nap.

Sertés: Hús és egyéb ehető szövetek: 5 nap.

Ló: Hús és egyéb ehető szövetek: 5 nap.

A készítmény alkalmazása emberi fogyasztásra szánt tejet termelő állatoknál nem engedélyezett.

Különleges tárolási óvintézkedések: Gyermekek elől gondosan el kell zárni! Ez az állatgyógyászati készítmény különleges tárolási körülményeket nem igényel. Ezt az állatgyógyászati készítményt csak a dobozon és az üvegen az 'Exp' után feltüntetett lejárati időn belül szabad felhasználni! A lejárati idő az adott hónap utolsó napjára vonatkozik. A közvetlen csomagolás első felbontása után felhasználható: 28 nap.

Az ártalmatlanná tételre vonatkozó különleges óvintézkedések: A gyógyszerek nem kerülhetnek a szennyvízbe vagy a háztartási hulladékba! A fel nem használt állatgyógyászati készítményt vagy az állatgyógyászati készítmény alkalmazása után keletkező hulladékokat az állatgyógyászati készítményre vonatkozó helyi előírásoknak és a nemzeti hulladékgyűjtési előírásoknak megfelelően kell ártalmatlanítani. Ezek az intézkedések a környezetet védik.

Az állatgyógyászati készítmények besorolása: Kizárólag állatorvosi vényre kiadható állatgyógyászati készítmény.

A forgalombahozatali engedély száma(i) és a kizserelések

EU/2/06/070/005 - EU/2/06/070/006 - EU/2/06/070/007

Kiszerezések: Dobozonként 1 x 50 ml-es, 1 x 100 ml-es vagy 1 x 250 ml-es, szintelen injekciós üveg.

Minden egyes üveg brombutil gumidugóval zárt és alumíniumkupakkal fedett.

Előfordulhat, hogy nem minden kiszerelem kerül kereskedelmi forgalomba.

A használati utasítás legutóbbi felülvizsgálatának dátuma: 2026/01

Erről az állatgyógyászati készítményről részletes információt érthető el a készítmények uniós adatbázisában

(<https://medicines.health.europa.eu/veterinary>).

Kapcsolattartási adatok

A forgalombahozatali engedély jogosultja és kapcsolattartási adatai a feltételezett mellékhatások bejelentése céljából:

Ceva Santé Animale, 8 rue de Logrono, 33500 Libourne, Franciaország

Tel.: + 800 35 22 11 51 - E-mail: pharmacovigilance@ceva.com

A gyártási tételek felszabadításáért felelős gyártó:

Ceva Santé Animale, 10 av. de La Ballastière, 33500 Libourne, Franciaország

NOT MELOXIDYL 20MG/ML 50ML IT ES HU 400x160/35.5x160 CODE ARTICLE : 55806-05 Recto Verso BLACK	MELOXIDYL 20MG/ML 50ML IT ES HU ID : 85797 CORPS : 8 Pts
------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------

OLIVIER 10/03/26 - 18/03/26 (2)