



18 mg/compressa  
Comprese per impianto sottocutaneo per ovini (femmine puberi)  
Melatonina



**NOME E INDIRIZZO DEL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO E DEL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE ALLA PRODUZIONE RESPONSABILE DEL RILASCIO DEI LOTTI DI FABBRICAZIONE, SE DIVERSI**

Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio:

Ceva Salute Animale S.p.A., Via dei Valtorta 48, 20127 Milano - Italia.

Produttore responsabile del rilascio dei lotti di fabbricazione:

Ceva Santé Animale, 10 avenue de la Ballastière, 33500 Libourne, Francia.

**DENOMINAZIONE DEL MEDICINALE VETERINARIO**

MELOVINE®, 18 mg, compresse per impianto sottocutaneo per ovini (femmine puberi).  
Melatonina

**INDICAZIONE DEL PRINCIPIO ATTIVO E DEGLI ALTRI INGREDIENTI**

Ciascuna compressa per impianto contiene:

**Principio attivo:**

Melatonina 18 mg.

Eccipienti q.b.

**INDICAZIONI**

Concentrazione dei parti durante la normale stagione riproduttiva.

**CONTROINDICAZIONI**

Non usare in animali sessualmente immaturi (impuberi). Ipsensibilità al principio attivo o ad uno qualsiasi degli eccipienti.

**REAZIONI AVVERSE**

Non note. Se dovessero manifestarsi reazioni avverse gravi o altre reazioni non menzionate in questo foglietto illustrativo, si prega di informarne il veterinario.

**SPECIE DI DESTINAZIONE:** Ovini (femmine puberi).

**POSOLOGIA PER CIASCUNA SPECIE, VIA E MODALITA' DI SOMMINISTRAZIONE**

Per via sottocutanea. Eseguire un impianto di 18 mg di melatonina per ciascun animale alla base dell'orecchio.

Schema trattamento:

Volendo ottenere una maggiore concentrazione delle nascite all'inizio della normale stagione riproduttiva (Gennaio-Febbraio), si consiglia di effettuare i trattamenti all'inizio di Giugno secondo il seguente schema:

A) 8 settimane prima della data prevista d'impianto isolare dai maschi gli animali da trattare (sia visivamente che olfattivamente).


B) 1 settimana dopo A) (9a settimana) eseguire l'impianto sottocutaneo alla base dell'orecchio.

C) 30-40 giorni dopo l'impianto introdurre i maschi (nel rapporto di 1:20); l'intervallo tra impianto ed immissione dei maschi nel gruppo non deve essere inferiore ai 30 giorni e superiore ai 40 giorni.

In tal modo è possibile, quando si trattano più animali contemporaneamente, ottenere una maggiore concentrazione dei parti, nel periodo stagionale riproduttivo più favorevole per gli agnelli.

Eseguire l'impianto alla base dell'orecchio con l'apposito applicatore.

Riempire il caricatore con una cartuccia di 25 impianti, inserire l'ago in sede sottocutanea alla base dell'orecchio e premere sulla leva per liberare un impianto. Ritirare l'ago e rilasciare la leva. La cartuccia avanza di un settore così che un nuovo impianto è pronto per l'animale successivo. Tra un trattamento e l'altro pulire l'ago con alcool. L'impianto non deve essere rimosso.



## **AVVERTENZE PER UNA CORRETTA SOMMINISTRAZIONE**

Il prodotto è sterile. Strappare con precauzione lungo le perforazioni per aprire ciascuna sezione del blister per quanto necessario. Evitare di danneggiare gli impianti. Usare solo aghi affilati ed integri. Durante l'esecuzione dell'impianto attenersi alle normali regole igieniche.

### **TEMPO DI ATTESA**

Carni e visceri: zero giorni.

Latte: zero giorni.

In caso di macellazione rimuovere il sito d'impianto dalla carcassa.

## **PARTICOLARI PRECAUZIONI PER LA CONSERVAZIONE**

Tenere fuori dalla vista e dalla portata dei bambini.

Questo medicinale veterinario non richiede alcuna speciale condizione di conservazione.

Non usare questo medicinale veterinario dopo la data di scadenza riportata sulla scatola dopo Scad.

## **AVVERTENZE SPECIALI**

Avvertenze speciali per ciascuna specie di destinazione:

Nessuna in particolare.

Precauzioni speciali per l'impiego negli animali:

Il prodotto è sterile. Strappare con precauzione lungo le perforazioni per aprire ciascuna sezione del blister per quanto necessario. Evitare di danneggiare gli impianti. Usare solo aghi affilati ed integri. Durante l'esecuzione dell'impianto attenersi alle normali regole igieniche.

Precauzioni speciali che devono essere adottate dalla persona che somministra il medicinale veterinario agli animali:

Nessuna in particolare, se non quella di rispettare le norme di igiene per la preparazione e la somministrazione del medicinale.

Impiego durante la gravidanza e l'allattamento:

Non pertinente. In caso di somministrazione accidentale non vi è alcun rischio per gli animali. L'utilizzo in tali circostanze è fuori dallo scopo (cfr. paragrafo "Posologia e via di somministrazione").

Interazione con altri medicinali veterinari ed altre forme d'interazione:

Nessuna conosciuta.

Sovradosaggio (sintomi, procedure d'emergenza, antidoti):

Non pertinente.

Incompatibilità:

In assenza di studi di compatibilità non miscelare con altri medicinali veterinari.

## **PRECAUZIONI PARTICOLARI DA PRENDERE PER LO SMALTIMENTO DEL PRODOTTO NON UTILIZZATO O DEGLI EVENTUALI RIFIUTI**

I medicinali non devono essere smaltiti nelle acque di scarico o nei rifiuti domestici, ma conferiti negli idonei sistemi di raccolta e di smaltimento per i medicinali non utilizzati o scaduti.

## **DATA DELL'ULTIMA REVISIONE DEL FOGLIETTO ILLUSTRATIVO**

09/2023

## **ALTRE INFORMAZIONI**

### **Presentazioni**

Scatola di 50 impianti (2 cartucce da 25 impianti ciascuna).

NOT MELOVINE IMPLANTS IT  
200X160  
CODE ARTICLE : 51596-04  
BLACK  
P 355

MELOVINE 2X25 IMPLANTS IT  
ID 77580  
CORPS : 7 pts

LOUIS 17/07/23