



## BİLEŞİMİ

2 ml aşı, aşağıdaki serum antikor ve koruma oranlarının kontrol hayvanlarında oluşmasına yetecek ölçüde antijen içerir:

*Clostridium perfringens*:

Anatoksin alfa..... 2 U.I./ml

Anatoksin beta. ....10 U.I./ml

Anatoksin epsilon. .... 5 U.I./ml

*Clostridium septicum* anatoksinini. .... 2,5 U.I./ml

*Clostridium oedematiens* (ya da *novyi*) anatoksinini. 3,5 U.I./ml

*Clostridium chauvoei* anakültürü. .... %90 koruma

*Clostridium tetani* anatoksinini..... 2,5 U.I./ml

Alüminli ekspan. .... 2 ml için yeterli miktarda

Koruyucu olarak: Formaldehid.....q.s. ....< %0,05

## ENDİKASYONLARI

Sığır, koyun, keçilerde *Cl.perfringens* A, B, C, D tipleri, *Cl.novyi* tip B (*Cl. oedematiens*), *Cl.septicum*, *Cl.tetani* ve *Cl.chauvoei*'nin neden olduğu aşağıda belirtilen clostridial enfeksiyonlara karşı korunma sağlar:

- Ergin Koyunlarda Enterotoksemiler,
- Buzağı ve Kuzularda Basiller Dizanteri,
- Yumuşak Böbrek Hastalığı,

- Kuzu ve Oğlaklarda Hemorajik Enteritler,
- Kara Hastalık (Enfeksiyöz Nekrotik Hepatit),
- Malign Ödem (Bradzet),
- Yanıkara,
- Gazlı Gangren,
- Tetanoz

## UYGULAMA ŞEKLİ VE DOZU

Coglavax, deri altı (SC) yolla aşağıdaki dozlarda uygulanır:

Kullanmadan önce çalkalayınız.

| DOZU                                              | AŞILAMA                             |                                                                  | RAPEL                                                           |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
|                                                   | 1. Enjeksiyon Zamanı                | 2. Enjeksiyon Zamanı                                             |                                                                 |
| KOYUN VE KEÇİLERDE                                |                                     |                                                                  |                                                                 |
| Gebe olmayan koyun ve keçilerde, koç ve tekelerde | 2 ml, belirli bir zamanı yoktur     | 1. enjeksiyondan 4 hafta sonra                                   | 2 ml, son enjeksiyondan 1 yıl sonra                             |
| Gebe koyun ve keçilerde                           | Gebeliğin ilk 2,5 ayından önce 2 ml | 1. enjeksiyondan 4 hafta sonra, gebeliğin 4. ayına kadar         | 2 ml, son enjeksiyondan 1 yıl sonra, gebeliğin 4. ayına kadar   |
| KUZU VE OĞLAKLARDA                                |                                     |                                                                  |                                                                 |
| Anaçları aşıllı kuzu ve oğlaklarda                | 8. haftada                          | 1. enjeksiyondan 4 hafta sonra                                   | 2 ml                                                            |
| Anaçları aşızsız kuzu ve oğlaklarda               | 3. haftada                          | 1. enjeksiyondan 4 hafta sonra                                   | 2 ml                                                            |
| SIĞIRLARDA                                        |                                     |                                                                  |                                                                 |
| Buzağı ve 100 kg'a kadar olan danalarda           | 2 ml, belirli bir zamanı yoktur     | 1. enjeksiyondan 4 hafta sonra                                   | 4 ml, son enjeksiyondan 1 yıl sonra                             |
| Dana ve ergin siğırlarda                          | 4 ml, belirli bir zamanı yoktur     | 1. enjeksiyondan 4 hafta sonra                                   | 4 ml, son enjeksiyondan 1 yıl sonra                             |
| Gebe ineklerde                                    | 4 ml, gebeliğin 6. ayında           | 1. enjeksiyondan 4 hafta sonra (gebeliğin 7. ayının ortalarında) | 4 ml, son enjeksiyondan 1 yıl sonra ve gebeliğin 7. ayına yakın |

## YASAL ARINMA SÜRESİ

Bulunmamaktadır.

## SAKLAMA KOŞULLARI

2-8C arasında saklayınız ve ışıktan koruyunuz.

## TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ

100 ml (50 koyun dozu), 250 ml (125 koyun dozu) ve 500 ml'lik (250 koyun dozu) polietilen flakonlarda ve karton kutularda piyasaya sunulmuştur.

Daha geniş bilgi için firmamıza başvurunuz.