

ADEMİN®



Veteriner Vitamin A, D₃, E Kombinasyonu Enjeksiyonluk Çözelti

Bileşimi

ADEMİN, koyu sarı renkli berrak enjeksiyonluk çözeltidir.

1 ml'de:

Vitamin A 500.000 I.U.

Vitamin D₃ 75.000 I.U.

Vitamin E 50 mg bulunur.

Endikasyonları

Besicilikte ve yetiştiricilikte A, D₃, E vitaminlerinin yetersizliklerinden (avitaminoz, hipovitaminoz) ileri gelen hastalıkların korunma ve tedavisinde kullanılır.

Damızlık hayvanlarda vitamin eksikliğinden ileri gelen verim düşüklüklerinde, büyüme ve gelişme yetersizliklerinde, besi hayvanlarında yemden yararlanma kabiliyetinin artırılması ve canlı ağırlık artışının hızlandırılmasında, vitamin eksikliği nedeniyle oluşan görme bozuklukları ve körlükte, ayak tutuklukları, felç ve topallıklarda, yapağı ve kıl dökülmelerinde, gebelik ve laktasyon dönemlerinde artan vitamin ihtiyacını gidermede, düzensiz östrüs ve döl tutmama durumlarında asıl tedaviye destekleyici olarak, raşitizm, osteomalasi gibi kemik bozukluklarında, yürüyüş zorlukları ve kas anomalilerinde destekleyici olarak, sinirsel bozukluklarda, hastalıkların iyileşme döneminde vücut direncinin artırılması amacıyla, diare ve çeşitli hastalıklar sebebiyle karotenden A vitamini sentezlenmesinin engellendiği durumlarda, besin değeri düşük veya aşırı miktarda nitrattan zengin gübrelerin ve pestisitlerin kullanıldığı veya taze otan mahrum otlaklar ile entansif yetiştiricilik yapılan işletmelerde kullanılır.

Kullanım Şekli ve Dozu

Veteriner hekim tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde, 1 ml Ademin / 50 kg canlı ağırlık hesabıyla;

Buzağı : 1-3 ml

Dana : 3-5 ml

Siğir : 5-8 ml

Kuzu - Oğlak : 0.25-0.5 ml

Koyun - Keçi : 1ml

Tavşan : 0.1-0.25 ml

ADEMİN siğirlara derin kas içi (IM), koyun ve diğer hayvanlara ise deri altı (SC) veya kas içi (IM) yolla verilir. Damızlık hayvanlara çiftleşme sezonundan 7-8 hafta önce ADEMİN uygulanmalıdır. Tedavinin 1-3 aylık aralarla tekrarı önerilir. Besi döneminde genellikle ayda bir yapılan ADEMİN uygulanmasıyla, hayvanların vitamin ihtiyacı karşılanmış olur.

Gıdalardaki İlaç Kalıntıları Hakkında Uyarılar

İlaç kalıntı arınma süresi (i.k.a.s.): Tedavi süresince ve son ilaç uygulanmasından sonra et ve süt için "0" gündür.

Kontrendikasyonları

Kedi ve köpeklerde kullanılmamalıdır.

Gebelikte Kullanım

Gebe hayvanlara uygulanmasında herhangi bir sakınca yoktur.

Muhafaza Şartları ve Raf Ömrü

Işıktan koruyunuz.

Kendi ambalajı içinde, serin ve kuru bir yerde, oda sıcaklığında (15-25°C) saklayınız.

Açılmış flakonlar kısa zamanda kullanılmalıdır. Raf ömrü üretim tarihinden itibaren 3 yıldır.

Ticari Takdim Şekli

Karton kutularda 20 ml, 100 ml ve 250 ml'lik Tip II amber renkli cam flakonlarda piyasaya sunulmuştur.

Daha geniş bilgi için firmamıza başvurunuz.