

SADECE HAYVAN
SAĞLIĞINDA KULLANILIR

Ceva® Sulphamezathine

Oral Çözelti
Veteriner Sistemik Antibakteriyel ve Antikoksidial

BİLEŞİMİ

Ceva® Sulphamezathine, berrak, kırmızı bir çözelti olup 1 ml'sinde 148,3 mg sülfadimidine eşdeğer 160 mg sülfadimidin sodyum ve renklendirici olarak ponceau – 4R (E124) içerir.

KULLANIM SAHASI VE ENDİKASYONLARI

Ceva® Sulphamezathine, etçi tavuk, etçi hindi ve ruminasyonu başlamamış buzağılarda sülfadimidine duyarlı Gram pozitif ve Gram negatif bakteriler ile koksidioz etkenleri tarafından meydana getirilen solunum ve sindirim sistemi enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılır. Etçi tavuk ve etçi hindilerde görülen koksidiozinin (kanlı ishalin) sağaltımında kullanılır, ayrıca tavukların koriza ve kolerası, pullorum, tavuk tifosu, pasteurellosis, hava kesesi enfeksiyonları, *E. coli* tarafından meydana getirilen enfeksiyonlarının tedavisinde endikedir. Buzağılarda ise duyarlı bakterilerce meydana getirilen gastroenteritis, kolibasilosis ve koliseptisemi gibi enfeksiyonlar ile koksidiozis tedavisinde kullanılır.

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU

Veteriner hekim tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde; Farmakolojik dozu: 100 mg sülfadimidin sodyum/gün/kg vücut ağırlığı
Pratik Doz Tablosu:

Hayvan Türü	Vücut Ağırlığı	Pratik Doz
Buzağı	80 kg	50 ml
Etçi Tavuk-Etçi Hindi	2,4 kg	1,5 ml

Buzağılarda pratik dozu 80 kg vücut ağırlığı için 50 ml oral çözelti olup 12-24 saat aralıklarla 3-5 gün süresince kullanılır. Etçi tavuk ve etçi hindilerde pratik dozu 2,4 kg vücut ağırlığı için 1,5 ml oral çözeltidir. Günlük su alımına bağlı olarak, 1-2 litre içme suyu içerisinde verilir. Ön seyreltme olmadan günlük tüketebileceği su miktarına karıştırılır. Tedavi süresinde ilaçlı su haricinde, hayvanlara başka su verilmemelidir. Akut koksidiozis durumunda 3 ardışık gün kullanımdan sonra 2 gün tedaviye ara verilir. Sonrasında tekrar 3 ardışık gün kullanılır. Subklinik koksidiozis durumunda 3 ardışık gün kullanılır. Doğru bir dozajlama için hayvanların vücut ağırlığı mümkün olduğunca doğru hesaplanmalıdır. İlaçlı suyun hayvanlar tarafından alımı klinik duruma göre değişebilmektedir. Bu nedenle doğru dozun sağlanabilmesi için ilaçlı suyun konsantrasyonunun ayarlanması gerekebilir. Uygun kalibre ağırlık ölçüm ekipmanlarının kullanımı tavsiye edilir. İlaçlı suya katılacak günlük miktar 12-24 saat içerisinde tüketilecek şekilde ayarlanmalıdır. İlaçlı su her 12-24 saatte bir taze olarak hazırlanmalıdır.

DOZ AŞIMINDA BELİRTİLER, TEDBİRLER VE ANTİDOT

Önerilen dozlar aşıldığı takdirde belirtilen istenmeyen/yan etkiler ortaya çıkabilmektedir. Bu durumda ilaç uygulaması durdurulmalı ve klinik semptomlara göre sağaltıma geçilmelidir.

Akut doz aşımı: kanatlılarda doz aşımını takiben su tüketiminde belirgin bir düşüş meydana gelebilir. Buzağılara süt ikamesi ile birlikte uygulanması su tüketiminde gerilemeye ve ishale neden olabilir.

Kronik doz aşımı: sülfanamidlerin uzun süreli alımı sonucu hemorajik semptomlar rapor edilmiştir. Hayvanları sekonder bakteriyel enfeksiyonlara duyarlılaştıran belirli derecede immunosupresyon meydana gelebilir (özellikle kanatlılarda gangrenöz dermatitis).

GIDALARDA İLAÇ KALINTI UYARILARI

İlaç kalıntı arınma süresi (i.k.a.s.): Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasından sonra sığırlar 21 gün, tavuk ve hindiler 14 gün geçmeden kesime gönderilmemelidir. Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasından sonra 5 gün (11 sağımlı) süreyle elde edilen inek sütleri insan tüketimine sunulmamalıdır. İnsan tüketimi için yumurta elde edilen tavuk ve hindilere uygulanamaz.

KONTRENDİKASYONLAR

Şiddetli karaciğer ve böbrek fonksiyon bozukluğu olan hayvanlarda kullanılmamalıdır. Sıvı alımında ya da idrar üretiminde düşüşe neden olan hastalıklarda veya asidüri durumlarında kullanılmamalıdır. Hematopoetik sistem hasan bulunan hayvanlarda kullanılmamalıdır.

Sülfonamidlere ve/veya yardımcı maddelerden herhangi birine hassasiyet gösteren hayvanlarda kullanılmamalıdır.

MUHAFAZA ŞARTLARI VE RAF ÖMRÜ

Özel saklama koşullarına ihtiyaç duyulmadan, kendi ambalajı içinde, dondurulmadan ve buzdolabına konulmadan, 25 °C'nin altında saklanmalıdır. Raf ömrü üretim tarihinden itibaren 36 aydır. Güneş ışığından koruyunuz. Açıldıktan sonra 6 ay içinde, sulandırıldıktan sonra 24 saat içinde kullanılmalıdır.

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ

100 ml'lik tip 3 kahverengi cam siseler bezaz renkli polietilen kapaklı şekilde karton kutuda satışı sunulmaktadır.

Daha ayrıntılı bilgi için firmamıza başvurun.