

SADECE HAYVAN SAĞLIĞINDA KULLANILIR

Kaldif®

Veteriner Mineral Enjeksiyonluk Çözelti

BİLEŞİMİ

Kaldif® Enjeksiyonluk Çözelti, berrak, açık sarıdan turuncuya varan renkte, steril çözelti olup 100 ml'sinde;

Kalsiyum glukonat	38.71 g (3.461 g kalsiyum eşdeğeri)
Kalsiyum hidroksit	1.32 g (0.714 g kalsiyum eşdeğeri)
Magnezyum klorit heksahidrat	6.5 g (0.777 g magnezyum eşdeğeri)
Borik asit	7.29 g içerir.

KULLANIM SAHASI VE ENDİKASYONLARI

Kaldif® Enjeksiyonluk Çözelti; sığır, koyun ve keçilerde bileşiminde yer alan etkin maddelerin yetersizliğinden kaynaklanan akut ve kronik metabolizma bozukluklarında destekleyici, koruyucu ve tedavi edici olarak kullanılır.

- İneklerde süt humması (paresis puerperalis, dana humması)
- Sığırlarda çayır tetanisi, ahır tetanisi, transit tetani
- Kas zayıflığı, ayağa kalkmada güçlük çekme durumlarında
- Raşitizm, osteomalasi ve benzer kemik hastalıkları
- Besi sığırlarında meydana gelen kalsiyum açığının giderilmesinde

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU

Veteriner hekim tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde;

Sığır (500 kg canlı ağırlık) 100 ml

Koyun-Keçi..... 10-15 ml

Belirtilen dozların tamamı yavaş damar içi (i.v) verilebileceği gibi, dozun bir kısmı veya tamamı deri altı (s.c.) da verilebilir.

Süt humması vakalarında her 6 saatte bir, yatan hayvan ayağa kalkıncaya veya ayakta durabilir hale gelinceye kadar ilaç uygulaması tekrarlanmalıdır. Hastalığın tekrarı halinde başarı elde edinceye kadar tedaviye devam edilir. Uygulamanın süresi ve periyodu hususu veteriner hekimin önerilerine göre belirlenir.

GİDALARDA İLAÇ KALINTI UYARILARI

İlaç Kalıntı Arınma Süresi (i.k.a.s.): Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasından sonra et ve süt için sıfır (0) gündür.

KONTRENDİKASYONLARI

Hiperkalsemi, hiperkalsuri ve kalp yetmezliği durumlarında kullanılmamalıdır.

MUHAFAZA ŞARTLARI VE RAF ÖMRÜ

Özel saklama koşullarına ihtiyaç duyulmadan, kendi ambalajı içinde, dondurulmadan ve buzdolabına konulmadan, 25 °C'nin altında oda sıcaklığında saklanmalıdır. Raf ömrü üretim tarihinden itibaren 24 aydır. Güneş ışığından koruyunuz. Açıldıktan sonra 28 gün içinde kullanılmalıdır.

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ

100 ve 250 ml'lik kiremit rengi bromobutil kauçuk tıpa ve "CEVA" logolu mavi renkli flip-off kapşonlu alüminyum kapak ile kapatılmış şeffaf renkli tip 1 cam flakonlarda piyasaya sunulmaktadır.

Daha geniş bilgi için firmamıza başvurunuz.