

NILZAN®

Oral Tablet

Veteriner Antihelmintik

BİLEŞİMİ

Nilzan® Oral Tablet, krem renkli, ön ve arka yüzü çentikli oral bir tablettir. Her tablet 150 mg levamisol HCl ve 300 mg oksiklozanid içermektedir.

KULLANIM YERİ / ENDİKASYONLAR

Sığır ve koyunlarda aşağıda yer alan gastrointestinal ve pulmoner nematodlar ve erişkin karaciğer keleşbeği enfestasyonlarının tedavisi ve kontrolünde kullanılır.

Akciğer kurdu: *Dictyocaulus* spp.

Gastrointestinal kurtlar: *Trichostrongylus* spp., *Cooperia* spp., *Ostertagia* spp. (inhibe larvalar hariç), *Haemonchus* spp., *Nematodirus* spp., *Bunostomum* spp., *Oesophagostomum* spp. ve *Chabertia* spp.

Bu ürün karaciğer safra yollarında bulunan çoğu *Fasciola* spp.'yi de ortadan kaldırır.

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU

Doğru dozun uygulanmasını sağlamak için vücut ağırlığı mümkün olduğu kadar doğru bir şekilde belirlenmelidir; dozajlama cihazının doğruluğu kontrol edilmelidir. Hayvanlar, bireysel olarak değil, toplu olarak tedavi edilecekse, düşük veya aşırı dozdan kaçınmak için vücut ağırlıklarına göre gruplandırılmalı ve uygun şekilde dozlanmalıdır.

Ürün, ağız yolu ile 7,5 mg levamisol hidroklorür/kg vücut ağırlığı, 15 mg oksiklozanid/kg vücut ağırlığı dozunda uygulanır.

Hayvan Türü	Canlı Ağırlık	Pratik Doz
Kuzu	20 kg	1 tablet
Koyun	40 kg	2 tablet
Buzağı-Dana	100 kg	5 tablet
Sığır	200 kg	10 tablet

Tabletler ortasındaki çentik vasıtasıyla kolayca iki eşit parçaya bölünebilir.

Veteriner hekim, yeterli parazit kontrolünü sağlamak için uygun dozlama programları ve stok yönetimi ile ilgili tavsiyelerde bulunmalıdır.

ÖZEL KLİNİK BİLGİLER VE HEDEF TÜRLER İÇİN ÖZEL UYARILAR

Bu ürün ileri derecede gebe olan ve hava koşulları, zayıf besleme, yönetim vb. nedenlerle stres altında olabilecek hayvanlarda dikkatle kullanılmalıdır.

Bu ürün sığırlarda Tip II ostertagiasis vakalarında etkili değildir.

Akciğer kurdu tedavisinden sonra, akciğerde meydana gelen hasar nedeniyle, belirli bir süre öksürük devam edebilir.

Sonunda tedavinin etkisiz kalmasına neden olabilecek direnç gelişimini artırma riski nedeniyle aşağıdaki uygulamalardan kaçınmaya dikkat edilmelidir.



-Belirli bir süre boyunca, aynı sınıf antihelmintiklerin çok sık ve tekrarlayan şekilde kullanımı.

-Uygulama cihazının kalibre edilmemiş olması, ürünün yanlış uygulanması veya vücut ağırlığının yanlış hesaplanması gibi nedenlerle düşük doz uygulanması.

Şüpheli klinik vakalarda dışkıda yumurta sayısı azalma testi gibi testlerin yapılması önerilir. Test sonuçları ürüne dirençli işaret etmesi halinde farklı bir sınıfta yer alan ve etki şekli farklı olan başka bir antihelmintik kullanılmalıdır.

Uygulama aparatı kullanılması halinde, aparatın pharyngitise yol açmaması için dikkatli olunmalıdır. Uygulamadan 14 gün sonra hayvanlar re-enfestasyonu engellemek için temiz bir ortama taşınmalıdır. Bu mümkün değilse 10-14 gün aralıklarla ürün uygulanması gerekebilir.

Gebelikte, Laktasyon ve Yumurtlama Döneminde Kullanım: Gebe hayvanlarda (son dönem hariç) kullanılabilir.

GIDA DEĞERİ OLAN HAYVANLARDA KALINTI UYARILARI

İlaç Kalıntı Arınma Süresi (İ.k.a.s.): Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasından sonra sığırlar 20, koyunlar 17 gün geçmeden kesime gönderilmemelidir. İnsan tüketimi için süt elde edilen sığır ve koyunlarda kullanılmaz.

KONTRENDİKASYONLAR

Bileşenlerinden birine duyarlı olduğu bilinen hayvanlarda kullanmayınız.

MUHAFAZA ŞARTLARI VE RAF ÖMRÜ

Özel saklama koşullarına ihtiyaç duyulmadan, kendi ambalajı içinde, dondurulmadan ve buzdolabına konulmadan, 25 °C'nin altında saklanmalıdır. Raf ömrü üretim tarihinden itibaren 60 aydır. Güneş ışığından koruyunuz. Kırılarak kullanılması durumunda, yarım tablet 7 gün içerisinde kullanılmalıdır.

Blister üzerinde bulunan baskı bilgilerinde, sayı dizisinde, ilk 4 sayı "Üretim tarihi ve yılını", sonraki 6 sayı "Seri no."sunu, SK harflerinden sonraki 4 sayı ise "Son kullanma tarihi" için ayı ve yılı belirtir.

KULLANIM SONU İMHA VE HEDEF OLMAYAN TÜRLER İÇİN UYARILAR

Kullanılmamış veya arta kalan ürün ilgili mevzuata göre imha edilmelidir.

TİCARİ TAKDİM ŞEKİLLERİ

10 tabletlik blisterlerde, 1 (10 tablet), 5 (50 tablet) ve 10 (100 tablet) adet blisterler karton kutularda satışa sunulmaktadır.

Daha ayrıntılı bilgi için firmamıza başvurunuz.