

OKZAN[®]

Veteriner Antihelmintik Oral Tablet

Bileşimi

Okzan Oral Tablet, krem renkli bir yüzü çentikli tablettir.

Her tablet:

Oksfendazol 250 mg

Oksiklozanid 750 mg içerir.

Endikasyonları/Kullanım Sahası

Okzan Oral Tablet, sığırların ve koyunların mide-barsak ve akciğer kıl kurtlarının ergin, larva ve yumurtalarının, karaciğer kelebeklerinin erginlerinin ve *Moniezia* sp. erginlerinin tedavisi ve korunmasında antihelmintik olarak kullanılır. Helmintlerin yumurtalarına sağladığı ovisid etkiyle meraların parazit yumurtalarıyla bulaşmasını önler.

a) Karaciğer kelebekleri

Fasciola hepatica, *Fasciola gigantica* (ergin).

b) Mide - barsak kıl kurtları

– Mide kıl kurtları: *Ostertagia* (inhibe larvalar dahil) sp., *Haemonchus* sp., *Trichostrongylus axei*,

– İnce barsak kıl kurtları: *Trichostrongylus* sp., *Nematodirus* sp., *Cooperia* sp. (inhibe larvalar dahil), *Bunostomum* sp.

– Kalın barsak kıl kurtları: *Chabertia* sp., *Trichuris* sp., *Oesophagostomum* sp.

c) Akciğer kıl kurtları: *Dictyocaulus* sp. (ergin ve larva formlarına)

d) Şeritler: *Moniezia* sp.'ye karşı etkilidir.

Kullanım Şekli ve Dozu

Veteriner hekim tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde; sığır, koyun, kuzu, buzağı ve danalara 5 mg/kg c.a oksfendazol ve 15 mg/kg c.a oksiklozanid hesabıyla; kuzulara 25 kg'a yarım tablet, koyunlara 50 kg'a 1 tablet, buzağı ve danalara 100 kg'a 2 tablet, sığırlara 500 kg'a 10 tablet verilir.

Tabletler ortasındaki çentik vasıtasıyla kolayca ikiye bölünebilir.

Okzan tabletler, alışılmış olan tabletler gibi yutturulur. Su içinde eritilerek şişeyle de içirilebilir.

Özel Klinik Bilgiler ve Uyarılar

-Ülkemizde parazit enfeksiyonların oluşma dönemi göz önüne alındığında yılda en az 2 kere; ilkbaharda mera sezonunun başlangıcında (meraya çıkıştan 2-3 hafta sonra) ve sonbaharda ahır sezonu başlangıcında Okzan Oral Tablet, uygulaması önerilir.

- Gebelik başlangıcı ve doğum sonrasında inaktif haldeki nematodlar aktif hale geçeceğinden hayvanlardaki parazit yükü artar. Koç katımından iki hafta önce tüm sürünün ilaçlanmasıyla meraların bulaşması ve kuzuların invazyona karşı korunması sağlanabilir, gebeliğin ve yavru gelişiminin sağlıklı olması mümkün olur.

- Tedavi edilen hayvanlar, parazitlerin atılabilmesi ve mera bulaşmasının önlenmesi için 8 saat kadar kapalı tutulmalıdır.

- Bölgenin koşullarına ve hedef parazitlerin durumlarına göre en uygun ilaçlama zamanı, ilaçlama sayısı ve uygulama aralıklarının belirlenmesi için veteriner hekime danışınız.

Gıdalarda İlaç Kalıntıları Hakkında Uyarılar

İlaç Kalıntı Arınma Süresi (i.k.a.s.): Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasından sonra, eti için yetiştirilen sığırlar 28 gün, koyunlar 21 gün süreyle kesime sevk edilmemeli, ineklerden elde edilen süt 5 gün (10 sağımlık) süresince insan tüketimine sunulmamalıdır. İnsan tüketimi için süt elde edilen koyunlara uygulanamaz.

Muhafaza Şartları ve Raf Ömrü

Kendi ambalajı içinde kuru bir yerde ve oda sıcaklığında (15-25°C) saklayınız.

Raf ömrü üretim tarihinden itibaren 4 yıldır.

Blister üzerinde bulunan baskı bilgilerinde, sayı dizisinde, ilk 4 sayı "Üretim ayı ve yılı", sonraki 6 hane "Seri no." sunu, "SK" harflerinden sonraki 4 sayı ise "Son kullanma tarihi için ayı ve yılı" belirtir.

Ticari Takdim Şekli

5 tabletlik blisterlerde, 2 (10 tablet), 4 (20 tablet) ve 10 (50 tablet) adet blister karton kutu içinde piyasaya sunulmaktadır.

Daha ayrıntılı bilgi için firmamıza başvurun.