

SADECE HAYVAN SAĞLIĞINDA KULLANILIR

Spectam®

Veteriner Bağırsak Antibakteriyeli
Oral Jel

BİLEŞİMİ

Spectam® Oral Jel; non-steril, berrak, viskoz, altın sarısı, kokusuz bir jeldir. 1 ml'sinde etkin madde olarak 50 mg spektinomisin (pentahidrat dihidroklorit tuzu olarak), koruyucu olarak benzoik asit ve renklendirici olarak tartrazin (FD&C yellow no:5) içermektedir.

KULLANIM SAHASI / ENDİKASYONLAR

Buzağı: Ruminasyonu başlamamış buzağılarda spektinomisine duyarlı *Escherichia coli*, *Pasteurella* spp., *Salmonella* spp., *Staphylococcus* spp. ve *Streptococcus* spp. tarafından meydana getirilen bakteriyel ishallerin tedavisinde kullanılır.
Kuzu: Yenidoğan bakteriyel hastalıkların önlenmesi için (örneğin kolostrum eksikliği riski taşıyan kuzularda görülen sulu ağız hastalığı gibi).

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU

Buzağı: Farmakolojik doz 10 mg spektinomisin /kg vücut ağırlığıdır. Günde iki kez 12 saat ara ile uygulanır ve tedaviye 2-5 gün süreyle devam edilir. Pratik dozu 50 kg için 10 pompa (10 ml)dir.

Kuzu: Farmakolojik doz, 50 mg spektinomisin/hayvandır. Doğumdan sonraki 48 saat içerisinde tek doz olarak uygulanır. Şişeye monte edilen pompa, her basıldığında 1 ml Spectam® Oral Jel verir. Ucundaki plastik hortum, ağzın yanından dilin arka tarafına doğru yerleştirilerek doza göre pompalanır. Yutkunma refleksinin engellenmemesi için dil hareketlerini kısıtlayıcı müdahalelerden kaçınılmalıdır. İlaç kullanmadan önce şişeye monte edilen pompa birkaç kez pompalanarak hava boşluğu alınmalıdır. Uygulamadan sonra pompa çıkarılarak temiz su ile durulanır. Temiz pompa orijinal kutusunda saklanır. Doğru dozajın verildiğinden ve gerektiğinden daha az veya fazla doz verilmesinden kaçınmak için vücut ağırlığı mümkün olduğunca doğru hesaplanmalıdır.

GIDA DEĞERİ OLAN HAYVANLARDA KALINTI UYARILARI

Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasından sonra kuzular 10 gün ve buzağılar 3 gün geçmeden kesime gönderilmemelidir.

KONTRENDİKASYONLAR

Tedavi dozlarında bilinen herhangi bir kontrendikasyonu yoktur. Etkin ve yardımcı maddelere duyarlı olan hayvanlarda kullanılmamalıdır. İştah, denge ve böbrek bozukluğu olan hayvanlarda dikkatli kullanılmalıdır.

MUHAFAZA ŞARTLARI VE RAF ÖMRÜ

Orijinal ambalajı içinde, dondurulmadan ve buzdolabına konulmadan, 25 °C'nin altında saklanmalıdır. Raf ömrü üretim tarihinden itibaren 36 aydır. Güneş ışığından koruyunuz. Açıldıktan sonra 6 ay içinde kullanılmalıdır.

KULLANIM SONU İMHA VE HEDEF OLMAYAN TÜRLER İÇİN UYARILAR

Kullanılmayan veteriner tıbbi ürün veya bu ürünün kullanımıyla ortaya çıkan atık maddeler yasalara göre tıbbi atık olarak imha edilmelidir. Her türlü materyal ve atık su, drenaj sistemleri ve çevreye atılmamalıdır.

TİCARİ TAKDİM ŞEKİLLERİ

Karton kutuda 100 ml'lik beyaz renkli polietilen şişelerde, beyaz renkli polietilen kapaklı ve şeffaf polivinil klorür hortum takılı beyaz renkli polietilen/polipropilen pompa ile birlikte.

Daha ayrıntılı bilgi için firmamıza başvurun.