

Yeldif® SE

Vitamin-Mineral

Enjeksiyonluk Süspansiyon

BİLEŞİMİ

Yeldif SE® Enjeksiyonluk Süspansiyon, beyaz renkli, süt görünümlü steril süspansiyon olup 1 ml'sinde 1 mg sodyum selenit ve 60 mg alfa-tokoferol asetat (vitamin E), koruyucu olarak 2 mg klorokrezol bulunmaktadır.

KULLANIM SAHASI / ENDİKASYONLAR

Koyun, kuzu, buzağı, oğlak ve taylarda vitamin E ve selenyum eksikliğine bağlı beyaz kas hastalığı gibi muskuler distrofi ve miyopatilerin önlenmesi ve tedavisinde kullanılır. Gebe koyunlara uygulanması, doğacak kuzularda benzer hastalıkların oluşma riskinin azaltılmasına yardımcı olabilir.

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU

Taylarda kas içi, diğer hedef türlerde kas içi veya derialtı yolla uygulanır.

Aşağıda verilen dozlar genel öneri niteliğindedir. İhtiyaç duyulan doz, hayvanların durumu, beslenme şekilleri vb. faktörlere bağlı olarak değişebilir.

Eksikliğin önlenmesi: tek doz olarak her kg vücut ağırlığı için 0,06 mg selenyum uygulanması önerilir. Pratik doz her 5 kg ağırlık için 0,3 ml'dir. Gebe koyunlardan doğacak kuzularda eksikliğin önlenmesi amacıyla gebeliğin üçüncü ayından sonra yukarıda verilen dozda uygulama yapılabilir.

Tedavi: Yukarıda verilen dozun her iki günde bir en fazla üç kere uygulanması gereklidir.

| Hayvan Türü | Vücut Ağırlığı (kg) | Pratik Doz (ml) |
|-------------|---------------------|-----------------|
| Koyun | 50 kg | 3 ml |
| Kuzu | 5 kg | 0,3 ml |
| Buzağı | 50 kg | 3 ml |
| Oğlak | 5 kg | 0,3 ml |
| Tay | 50 kg | 3 ml |

ÖZEL KLİNİK BİLGİLER VE HEDEF TÜRLER İÇİN ÖZEL UYARILAR

Selenyumun toksisitesinden dolayı, "Dozaj ve uygulama yolu" bölümünde belirtilen dozlara ve son tarihlere uyulması önemlidir. Ürünü enjekte ederken gerekli aseptik kurallara uyunuz.

İSTENMEYEN ETKİLER

Çok seyrek olarak, uygulamadan sonra enjeksiyon bölgesinde lokal enflamatuvar reaksiyonlar görülebilir. Çok seyrek olarak, anafilaktik şok tipi ile hayvanın ölümüne kadar ilerleyebilen kardiyovasküler bozukluklar, yatis, koma reaksiyonları da gözlenmiştir.

DOZ AŞIMINDA BELİRTİLER, TEDBİRLER VE ANTİDÖT

Kuzularda 10-15 mg selenyum oral yolla ölüme yol açabilir. Enjeksiyon olarak uygulanan 5 mg selenyum kuzularda ölüme neden olabilir. Stres altındaki hayvanlar selenyum toksisitesine daha duyarlıdır. Selenyum doz aşımı durumunda gözlenebilecek semptomlar şunlardır: hızlı ve kuvvetli nabız, nefes darlığı, kolik, poliüri, siyanoz, yatis, depresyon ve ataksi. Doz aşımına maruz kalmış bir hayvanın yönetimi, doğru hidrasyonla (infüzyon veya libitum su verme) ve semptomatik tedaviye (şok, dispne) dayanır.

GIDA DEĞERİ OLAN HAYVANLARDA KALINTI UYARILARI

Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasından sonra 28 gün geçmeden koyun, kuzu, buzağı ve oğlaklar kesime gönderilmemelidir. Sütü insan tüketimine sunulan koyunlarda kullanılmaz.

KONTRENDİKASYONLAR

Bileşenlerinden herhangi birine duyarlı olduğu bilinen hayvanlarda kullanılmaz.

Gebe ineklerde kullanılmaz.

MUHAFAZA ŞARTLARI VE RAF ÖMRÜ

Kendi ambalajı içinde, dondurulmadan ve buzdolabına konulmadan, 25 °C'nin altında saklanmalıdır. Raf ömrü üretim tarihinden itibaren 48 aydır. Güneş ışığından koruyunuz. Açıldıktan sonra 28 gün içinde kullanılmalıdır. İlk kullanımı takiben tıpanın 60 defadan fazla delinmemesi önerilir.

KULLANIM SONU İMHA VE HEDEF OLMAYAN TÜRLER İÇİN UYARILAR

Kullanılmamış veya arta kalan ürün ilgili mevzuata göre imha edilmelidir.

TİCARİ TAKDİM ŞEKİLLERİ

20 ml ve 100 ml'lik amber renkli tip 2 cam flakonlarda, bromobutil tıpalı, gümüş rengi alüminyum kapsüllü ve "YELDİF SE" logolu sarı renkli flip-off kapaklı şekilde karton kutuda satışa sunulmaktadır.

Daha ayrıntılı bilgi için firmamıza başvurun.