

TETRAAMEZATİN®

Veteriner Sistemik Antibakteriyel ve Antikoksidiyal
Oral Çözelti Tozu

Bileşimi

Tetramezatin, açık sarı renkli suda eriyen tozdur.

1 ölçek 2.5 g Tetramezatin;

Sülfadimidin sodyum

2 g

Oksitetrasiklin HCL

0.3 g içerir.

Endikasyonları

Tetramezatin, ruminasyonu başlamamış kuzu, buzağı, oğlak, tay ile kedi ve köpeklerde duyarlı bakteriler tarafından meydana getirilen solunum, sindirim sistemi enfeksiyonlarında ve sepsisemilerde kullanılır.

Kullanım Şekli ve Dozu

Veteriner hekim tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde; 40 kg canlı ağırlık için 2,5 g Tetramezatin hesabıyla aşağıdaki dozlarda kullanılır.

Hayvan Türü

Günlük Verilecek Tetramezatin Miktarı

Kuzu (20 kg)

1/2 ölçek

Buzağı (40 kg)

1 ölçek

Tay (80 kg)

2 ölçek

Kedi-köpek (8 kg)

0,5 gram

Tetramezatin'li su, taze hazırlanmalı ve hemen verilmelidir. Süt ile karıştırılmamalıdır. Tedaviye 3-5 gün devam edilmelidir.

İlaç Etkileşimleri

Prokain penisilin G ile sülfamidler antagonistik etki oluşturabileceğinden birlikte kullanılmamalıdır. Amonyum klorit ve idrar asitleştiriciler ile birlikte verildiğinde üriner sistemde kristaluriye neden olabilir. Nikotinamid, folik asit, kolin gibi B kompleks vitaminleri ve bunların ön maddeleri olan glutamik asit ve metiyonin gibi aminoasitler sülfonamidlerle antagonistik etki oluşturabilirler. Diüretiklerle birlikte kullanılmaları trombosit sayısında azalmalara yol açabileceğinden bu ilaçlarla birlikte kullanılmamalıdır. Yardımcı enzimler, glukoz ve subline de sülfonamidlere antagonist etkili olduğundan birlikte kullanılmamalıdır.

Tetrasiklinler, betalaktam ve aminoglikozid antibiyotiklerle birlikte kullanılmamalıdır. Metoksifluranın böbreğe yönelik etkisini artırır ve protrombinin etkinliğini baskı altına alabilir. Penisilin G sodyum, penisilin G potasyum, sodyum bikarbonat, tiyopental sodyum, varfarin sodyum, sefalotin sodyum, sefapirin sodyum, amikasin sülfat, aminofilin, amfoterisin B, dimenhidrinat, demir dekstran, eritromisin glusefat, heparin sodyum, fenobarbital sodyum, hidrokortizon sodyum süksinat, kalsiyum klorür, kalsiyum glikonat, kloramfenikol, sodyum süksinat, metisilin sodyum, morfin sülfat ile birlikte farmakolojik uyumsuzluk nedeniyle kullanılmamalıdır. Oral yolla süt ile birlikte verilmemelidir. Süt emmeden 2-3 saat önce veya sonra verilmelidir. Yemleme esnasında veya yemlemeyi takiben verildiğinde veya ortamda süt ve süt ürünleri ile kalsiyum, alüminyum, mangan, çinko gibi iki veya üç değerli minerallerin bulunması durumunda emilme oranı önemli ölçüde azaldığı için, bu türden uygulamalardan kaçınılmalıdır. Bu tür ürünlerden en az 2 veya 3 saat önce veya sonra verilmelidir.

Doz Aşımında Belirtiler, Tedbirler ve Antidotu

Özellikle yüksek dozlarda kullanılması sırasında olmak üzere, sindirim kanalı mikroflorasını bozabilir. Oksitetrasiklin ve sülfadimidin farmakolojik yönden oldukça güvenli maddelerdir. Ağızdan oksitetrasiklin dozu 400 mg/kg'ı geçmedikçe herhangi bir akut toksisite ile karşılaşmaz. Ama, özellikle yüksek dozlarda veya uzun süreli kullanım sırasında, yukarıda belirtilen istenmeyen etkilerle karşılaşılabilir. Sülfadimidin genellikle güvenli bir maddedir; ama, seyrek de olsa, yukarıda belirtilen istenmeyen etkilerle karşılaşılabilir.

Gıdalardaki İlaç Kalıntılarıyla İlgili Uyarılar

İlaç Kalıntı Arınma Süresi (i.k.a.s.); Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasını takiben kuzu ve buzağılar 14 gün süreyle kesime sevk edilmemelidir.

Kontrendikasyonlar

Sülfonamidlere hassasiyet gösteren hayvanlarda ve şiddetli karaciğer ve böbrek fonksiyon bozukluğu olan hayvanlarda kullanılmamalıdır.

Daha ayrıntılı bilgi için firmamıza başvurun.