

YENİLİKÇİ



FLAKON

KULLANICI DOSTU



Lider enjektabl amoksisilin



Kolay şırıngabilite ve süspansibilite



Kullanıcı dostu, yenilikçi CLAS flakon



Uzun etki



BİLEŞİMİ: Moksidif® LA, bej-krem renkli bir süspansiyon olup her 1 ml'de: 150 mg amoksisiline eşdeğer 172,17 mg amoksisilin trihidrat içerir. **FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ:** Amoksisilin 6 APA'ya sahiptir. İçeren yarı sentetik bir aminopenisilin türevidir. Bakteri duvarına hızla etki ederek şekil bozukluğuna, erimelere neden olur. Gram pozitif ve gram negatif bakterilere (özellikle Pasteurella haemolytica, Pasteurella multocida) karşı etkili geniş spektrumlu bakterisid bir antibiyotiktir. **Duyarlı bakteriler:** Beta hemolitik Streptococcus spp.'leri de içeren çoğu gram pozitif bakteriler (Strept. agalactiae, S. zooepidemicus, S. dysgalactiae, S. uberis, Staphylococcus spp., Bacillus anthracis, Actinomyces spp., çoğu Corynebacterium spp., Erysipelothrix rhusiopathiae, Listeria monocytogenes), bazı anaeroblar (Clostridium spp., çoğu Fusobacterium spp., bazı Bacteroides spp.), bazı gram negatif aeroblar (Haemophilus somnus, Borella spp., Leptospira spp., Actinobacillus spp., Haemophilus spp., Moraxella spp., Pasteurella spp.). **Orta dereceli duyarlılık gösteren bakteriler:** Kazanılmış bağışıklık nedeniyle değişimle birlikte şu bakteriler orta derecede duyarlıdır: Proteus spp., Campylobacter spp., Rhodococcus equi, E. Coli, Salmonella spp., Bordetella bronchiseptica. **Dirençli bakteriler:** Bacteroides fragilis, Citrobacter spp., Klebsiella spp., Pseudomonas aeruginosa, Serratia spp., Yersinia enterocolitica. Moksidif® LA'nın kas içi (IM) yolla uygulama sonrası, amoksisilin'in mutlak biyoyararlanımı sigırlar için % 96'dır. Uygulandıktan hemen sonra iyi nüfuz etmesi nedeniyle dokularda yüksek konsantrasyon sağlar. Özel formülasyonu sayesinde sigırlarda 48 saat süren etkili plazma konsantrasyonları elde edilir. Se rum proteinlerine düşük düzeyde bağlanır. Tedaviye yanıt çok hızlıdır. İdrar ve safra ile yüksek konsantrasyonlarda ve aktif olarak atılır. Enjeksiyon yerinde iritasyon yapmaz. **ENDİKASYONLARI:** Moksidif® LA sigır ve koyunlarda duyarlı bakteriler tarafından meydana getirilen; • So-lunum yolu enfeksiyonları (Pasteurelloz) • Sindirim yolu enfeksiyonları • Deri ve yumuşak doku enfeksiyonları • Ürogenital sistem enfeksiyonları • Postoperatif enfeksiyonlarda kullanılır. **KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU:** Kullanmadan önce içeriği okuyunuz. Veteriner hekim tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde: Koyun ve sigırlara kas içi enjeksiyon yoluyla 10 kg canlı ağırlığa 1 ml hesabıyla (15 mg amoksisilin / kg canlı ağırlık) tek doz olarak uygulanır. Veteriner hekimin gerekli gördüğü vakalarda doz 48 saat sonra tekrarlanır. Aynı enjeksiyon yerinde sigırlarda en fazla 20 ml, koyunlarda 5 ml enjekte edilmelidir. **İSTENMEYEN ETKİLER:** Penisilinlerin en önemli yan etkileri akut anafaksi ve kolapstir. Ayrıca daha az siddette ama daha sıklıkla aşırı duyarlılık reaksiyonları (ürtiker, ateş, anjionörötik ödem gibi) görülebilir. Anafaksi olgusuna epinefrin ve/veya oksijen, IV yolla steroid uygulanmalıdır. **İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ:** Fenikoller ve tetrasiklinler gibi bakteristatik ilaçlarla birlikte uygulanmamalıdır. Beta-laktamlar genel olarak aminoglikozidlerle sinerji olarak etkilidirler. **DOZ ASIMINDA BELİRTİLER, TEDBİRLER VE ANTİDOT:** Amoksisilin oldukça düşük toksisiteli bir maddedir. Bir defada veya tekrarlanarak verilen oldukça yüksek dozlarda bile belirgin bir zehirlenme veya yan etki gözlemlenmez. **GİDALARDA İLAÇ KALINTILARI HAKKINDA UYARILAR:** İlaç Kalıntı Arınma Süresi (İ.K.A.): Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasından sonra sigırlar ve koyunlar 30 gün geçmeden kesime gönderilmemelidir. Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasını takiben 14 sağımlı (7 gün) boyunca elde edilen koyun sütleri, 10 sağımlı (5 gün) boyunca elde edilen inek sütleri insan tüketimine sunulmamalıdır. Enjeksiyon noktası için ilaç kalıntı arınma süresi 50 gündür. Sütteki kalıntı arınma süresinin uzun olması nedeniyle insan tüketimi için süt elde edilen koyunlara uygulanması tavsiye edilmez. **KONTRENDİKASYONLARI:** Penisilin ve sefalosporinlere alerjisi olan hayvanlarda kontrendikedir. Hedef olmayan türler için uyarılar Tavşan, kobay, hamster gibi küçük kemirgenlerde, kaz, ördek gibi suya ayakta ve ergin atlarda kullanılmamalıdır. **GENEL UYARILAR:** Kullanmadan önce ve beklenmeyen bir etki görüldüğünde veteriner hekimine danışınız. Çocukların ulaşamayacağı yerde ve ısıtıcı maddelerinden uzakta bulundurunuz. Raf ömrü geçmiş ve ambalajı hasarlı ürünleri satın almayınız ve kullanmayınız. Kullanmadan önce içeriği iyice okuyunuz. **UYGULAYICININ ALMASI GEREKEN ÖNLEMLER:** Sefalosporinlere ve penisilinlere duyarlı olduğu bilinen kişiler ilaçla hiçbir şekilde temas etmemelidir. Duyarlı kişilerin ilacı ağız, deri veya inhalasyon yoluyla maruz kalmaması gerekir. Göz ve dudaklarda şişme, nefes almada zorluk gibi belirtiler meydana gelmesi halinde acil tıbbi müdahale gerekir. Kullanmadan sonra ellerinizi yıkayınız. **MUHAFAZA ŞARTLARI VE RAF ÖMRÜ:** Kendi ambalajı içinde, kuru bir yerde ve oda sıcaklığında (15-25°C) saklayınız. **Raf ömrü** imal tarihinden itibaren 3 yıldır. Açıldıktan sonra 28 gün içinde tüketilmelidir. **TİCARİ TAYDİM ŞEKLİ:** 50, 100 ve 250 ml'lik renkli cam şişe ve 50, 100 ve 250 ml'lik çok katmanlı plastik flakonlarda, karton kutu içinde piyasaya sunulmaktadır. **SATIS YERİ VE ŞARTLARI:** Veteriner hekim reçetesi ile eczanelerde, veteriner muayenehane ve polikliniklerinde satılır (VHR). **PROSPEKTÜSÜN ONAY TARİHİ:** 28.06.2004 T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI RUHSAT TARİHİ VE NO: 07.11.1997-6/55 RUHSAT SAHİBİ: Ceva Hayvan Sağlığı A.Ş. İz Plaza Giz Eski Büyükdere Cad. No: 9 Kat: 20-21 Maslak 34398 İstanbul - Türkiye İMAL YERİ: Ceva Santé Animale - 10, av. de La Ballastière - 33500 Libourne - France



Referanslar
1. CEESA 2011
2. Forget P. 2012, SNGTV Congress (France)
3. CEVA internal data

Ceva Hayvan Sağlığı A.Ş. İz Plaza Giz Eski Büyükdere Cad. No: 9 Kat: 20-21
Maslak 34398 İstanbul Tel: 0 212 365 97 97 Faks: 0 212 290 70 83

tr.ceva.com

cevolution
Üstün Enjeksiyon



Moksidif® L.A.

UZUN ETKİLİ, GÜVENİLİR AMOKSİSİLİN



İLK TERCİH

cevolution
Üstün Enjeksiyon



LİDER ENJEKTABL AMOKSİSİLİN



YÜKSEK ORANDA ŞIRINGABİLİTE VE SÜSPANSİBİLİTE



HAYVAN SAĞLIĞINDA LİDER ENJEKTABL AMOKSİSİLİN¹

Moksidif® LA, tüm dünyada veteriner hekim ve yetiştiriciler tarafından en fazla tercih edilen enjektabl amoksisilindir.

➤ **Yüksek Kalite ve Etkinlik**

➤ **Lider Ürün**

Moksidif® LA, *M.haemolytica* ve *P.multocida*'nın neden olduğu sığır solunum sistemi hastalıklarında etkin bir tedavi seçeneğidir.



CLAS FLAKON: KOLAY KULLANIM VE STABİLİTENİN KORUNMASI İÇİN YENİLİKÇİ AMBALAJ

MOKSIDİF® LA'nın ambalajı CLAS flakondur. CLAS flakon şu avantajları sağlar:

Hafif

Cam flakondan 6 kat daha hafif

Ergonomik

Kolay kullanım için özel şekil

Dayanıklı

Düşme, çarpma sonucu oluşabilecek kırılmaya karşı dayanıklı

Stabilite


Isı ve nem gibi her tür durumda mükemmel stabilite



Moksidif® LA: MÜKEMMEL SÜSPANSİBİLİTE, OPTİMUM ŞİRINGABİLİTE²

➤ Ceva Hayvan Sağlığı, yaygın oranda antibiyotik kullanılan hayvan sağlığı pazarında, kullanım kolaylığı sağlaması amacıyla, kolay süspanse ve şırınga edilebilen özel bir formülasyon geliştirmiştir.


30 sn.den daha az sürede enjekte edilebilen yüzde oran



UZUN SÜRELİ VE YÜKSEK ETKİNLİK SAĞLAYAN ÖZEL FORMÜLASYON³

Moksidif® LA hem suda hem de yağda çözünebilen farmakolojik karakteri ve geniş spektrumu sayesinde, etkenin belli olmadığı acil durumlarda ilk tercih olarak kullanılabilir.

YÜKSEK PLAZMA PİKİ



Enjeksiyon sonrası 2 saat içerisinde hızlı bir şekilde plazma pikine ulaşır ve özel formülasyonu sayesinde etkisi 48 saate kadar devam eder.

UZUN ETKİ