menos es más

0 horas de tiempo de espera en **leche**

Indicado para **ovino y caprino**

Eprecis®
LA SOLUCIÓN INYECTABLE

Eprecis® presenta alta seguridad y es fácil de utilizar

- Eprecis® se administra vía subcutánea.
  No requiere separar el abrigo de la línea de la espalda.
  No supone ningún problema la presencia de lana.

- Eprecis® es de fácil jeringabilidad gracias a su bajo volumen por dosis (0,1 ml/ 10 kg peso vivo), lo que permite una **cómoda y rápida administración.**

- Eprecis® está disponible en **vial CLAS,**
  es resistente a los golpes y su forma ergonómica permite un cómodo manejo en granja.

menos limitaciones

menos volumen de dosis

más fácil de usar

La eprinomectina es una molécula de gran valor

+

- La eprinomectina es **un potente endectocida** con protección de amplio espectro frente a nematodos en ovino[1] y caprino.[2]

+

- La eprinomectina tiene un bajo índice leche/plasma; consecuentemente, la fracción de dosis recuperada en leche es muy baja

→ **0 horas de tiempo de espera en leche**

+

- **Existe** la resistencia antihelmíntica en nematodos gastrointestinales

=

¡Usemos la eprinomectina de forma responsable!

Eprecis® para combatir las pérdidas económicas ocasionadas por las infestaciones de parásitos

- En infecciones experimentales, con la aplicación de Eprecis® se observó **una gran eficiencia como tratamiento de los principales nematodos gastrointestinales** en caprino.[3]

97.8%
Haemonchus contortus
en el abomaso

98.7%
Trichostrongylus colubriformis
en el intestino delgado

- En ovejas lactantes, con Eprecis® se ha observado una **alta eficiencia sobre nematodos[4] gastrointestinales asociado con un aumento de la producción de leche.**[5]





Recuento de huevos en heces en 150 ovejas lactantes naturalmente expuestas a los parásitos gastrointestinales y tratadas con una inyección única de Eprecis®

Las ovejas tratadas recibieron una inyección de Eprecis® en el día 0. Las ovejas tratadas con un IHF>300 pasados los 60 días recibieron una segunda inyección

Utilizando antiparasitarios eficaces como Eprecis®, puedes prevenir la pérdida de producción de los animales

La vía de administración que marca la diferencia

- En caprino, la **biodisponibilidad de la eprinomectina después de la inyección de una sola dosis de Eprecis®(0.2mg/kg) es mucho mayor de lo que se espera para la formulación *pour-on* de la eprinomectina (1.0mg/kg)** [6,7] Además, se observó que la eprinomectina inyectable es 4 veces más eficaz que la formulación *pour-on* en 4 días en granjas de caprino.[8]



- En ovino, Eprecis® inyectable está asociado a una **mayor concentración plasmática** de eprinomectina y tiene una **mayor eficacia** comparado con la formulación *pour-on* en ovejas de leche naturalmente infectadas con nematodos gastrointestinales.[9]

Eficacia de la eprinomectina en ovejas lactantes



99.6% para Eprecis® inyectable vs 86.1% para la formulación *pour-on*

Con Eprecis puedes conseguir mejores resultados administrando 5 veces menos concentración que con una eprinomectina *pour-on*

sépreciso con Eprecis®

Gran estabilidad

Resistencia antichoque

Agarre cómodo

Ligero

- **Vial de alta tecnología** adaptado a las condiciones de la granja
- **Muy resistente a los choques** para menos pérdidas y roturas[10]
- **Forma ergonómica adaptada** para un manejo óptimo y cómodo
- **Estructura multicapa hi-tech** para una mejor estabilidad del producto
- Un 33% más **respetuoso con el medio ambiente**[11]

Dosificación : 0,1ml/10kg peso vivo

100 ml y 250 ml

Referencias: 1. Cringoli, G., *et al.* 2003. Efficacy of eprinomectin pour-on against gastrointestinal nematode infections in sheep. Vet. Parasitol. 112, 203–209. • **2**. Cringoli, G., *et al.* 2002. Effectiveness of eprinomectin pour-on against gastrointestinal nematodes of naturally infected goats. Small Rumin. Res. 55, 209–213. • **3.** Briqué-Pellet, C., *et al.* 2017. Pharmacokinetics and anthelmintic efficacy of injectable eprinomectin in goats. Vet. Parasitol. 241, 43–47. • **4.** Termatzidou, S.-A. *et al.* 2019. Anthelmintic activity of injectable eprinomectin (Eprecis® 20 mg/mL) in naturally infected dairy sheep. Vet. Parasitol. 266, 7–11 · **5.** Termatzidou, S.-A., *et al.* 2020. Effect of injectable eprinomectin on milk quality and yield of dairy ewes naturally infected with gastrointestinal nematodes. Vet. Parasitol. 286, 109245. • **6.** Eprecis 20 mg/ml solución inyectable para bovino, ovino y caprino (sección 5.2 Ficha Técnica) • **7.** Eprinex mg/ml *pour-on* (sección 5.2 Ficha Técnica) • **8.** Couasnon, F., 2019. Méthodes de détection des suspicions d'inefficacité de l'éprinomectine administrée par voie topique chez des caprins laitiers (Thèse Vétérinaire). Oniris / Université de Nantes. • **9.** Bordes et al. 2020. Lack of efficacy of eprinomectin in dairy sheep and goats: resistance or poor exposition of worms to the drug? Congrès National des GTV, Poitiers, 2020. · **10.** Cavaroc P.J. *et al.* – Comparative breakage study of injectable anti-infectives vials under vertical drop test by free fall under standardized conditions. IPVS Congress, 2012, 100. • **11.** Jacquet C. et al. Analyse de cycle de vie comparative, rapport final avec revue critique, système de conditionnement CLAS et Système de conditionnement traditionnel en verre. 2016, APESA 0393 · **12.** Estudio de satisfacción llevado a cabo por Ceva en 540 ganaderos (Francia, 2012)

Eprecis 20 mg/ml solución inyectable para bovino, ovino y caprino. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA: Cada ml contiene: Sustancia activa: Eprinomectina 20,0 mg. **Indicaciones de uso, especificando las especies de destino**: Tratamiento de infestaciones por los siguientes parásitos internos y externos sensibles a la eprinomectina. **Bovino:** *Ostertagia ostertagi, Cooperia spp. (adultos, L4, inhibidas L4) Cooperia oncophora, Cooperia pectinata, Cooperia surnabada, Cooperia punctata, Haemonchus placei, Trichostrongylus axei, Trichostrongylus colubriformis, Trichostrongylus spp., Bunostomun phlebotomum, Hematodirus helvetianus, Oesophagostomum radiatum, Dictyocaulus viviparus (adultos and L4); Ostertagia lyrata, Oesophagostomum spp., Trichuris spp. (adultos); Haematopinus eurysternus, Linognathus vituli, Solenopotes capillatus, Haematobia irritans, etapas parasitarias de Hypoderma bovis y Hypoderma lineatum; Sarcoptes scabiei var. bovis.* Prevención de reinfestaciones: El medicamento veterinario protege a los animales frente a reinfestaciones por: *Trichostrongylus spp. (incluyendo Trichostrongylus axei y richostrongylus colubriformis), Haemonchus placei, Cooperia spp. (incluyendo Cooperia oncophora, Cooperia punctata, Cooperia surnabada), Dictyocaulus viviparus, , Oesophagostomum radiatum y Ostertagia spp. (incluyendo Ostertagia ostertagi y Ostertagia lyrata) y Nematodirus helvetianus* durante 14 días. - *Haematobia irritans* durante un mínimo de 7 días. **Ovino:** *Teladorsagia circumcincta (pinnata/trifurcata), Haemonchus contortus, Trichostrongylus axei, Trichostrongylus colubriformis, Nematodirus battus, Cooperia curticei, Chabertia ovina y Oesophagostomum venulosum.* **Caprino:** *Teladorsagia circumcincta (pinnata/trifurcata), Haemonchus contortus, Trichostrongylus axei, Trichostrongylus colubriformis, Nematodirus battus, Cooperia curticei, Oesophagostomum venulosum y Dictyocaulus filaria.* **Contraindicaciones:** No usar en otras especies animales. No usar en casos de hipersensibilidad conocida a la sustancia activa o a algún excipiente. No administrar por vía oral, intramuscular o mediante inyección intravenosa. **Advertencias especiales para cada especie de destino:** Bovino, ovino y caprino Se debe tener precaución para evitar las siguientes prácticas porque aumentan el riesgo de desarrollo de resistencias y en última instancia podrían conllevar a una terapia ineficaz: - Uso demasiado frecuente y repetido de antihelmínticos de la misma clase durante un periodo prolongado de tiempo. - Infradosificación, que puede ser debida a una subestimación del peso vivo, mala administración del medicamento veterinario o falta de calibración del dispositivo de dosificación (si lo hay). Los casos clínicos sospechosos de resistencia a antihelmínticos deben investigarse usando pruebas adecuadas (p.e Test Reducción del Contaje de huevos fecales). Cuando los resultados de las pruebas sugieran la resistencia a un antihelmíntico en particular, debe utilizarse un antihelmíntico perteneciente a otra clase farmacológica y con un mecanismo de acción diferente. Si existe riesgo de reinfección, consultar con el veterinario la necesidad y frecuencia de la administración repetida. Bovino Se ha informado de resistencia a otras lactonas macrocíclicas en especies de parásitos en bovino dentro de la UE. Por lo tanto, el uso de este medicamento veterinario debe basarse en la información epidemiológica local (regional, granja) sobre la sensibilidad de los nematodos y las recomendaciones sobre cómo limitar aún más la selección para resistencia a los antihelmínticos. Ovino y caprino Se ha informado de resistencia a la eprinomectina en especies de parásitos en ovino y caprino dentro de la UE. Por lo tanto, el uso de este medicamento veterinario debe basarse en la información epidemiológica local (regional, granja) sobre la sensibilidad de los nematodos y las recomendaciones sobre cómo limitar aún más la selección para resistencia a los antihelmínticos. **Reacciones adversas (frecuencia y gravedad): Bovino:** Muy frecuentemente después del tratamiento se ha observado hinchazón del punto de inyección de moderado a severo. Por lo general, la inflamación desaparece en un lapso de 7 días, pero la induración (dureza) puede persistir durante más de 21 días. La hinchazón puede estar asociada con dolor leve a moderado. Esta reacción desaparece sin ningún tratamiento y no afecta a la seguridad o eficacia del medicamento veterinario. **Ovino y caprino:** Muy frecuentemente hinchazón ligera a moderada del punto de inyección. Por lo general, la hinchazón desaparece en 16 a 18 días. **Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción:** La eprinomectina se une fuertemente a proteínas plasmáticas, por lo que se debería tener en cuenta si se administra junto con otras moléculas que tengan las mismas características. **Posología y vía de administración:** Vía subcutánea. Para una única administración. Una dosis de 0,2 mg de eprinomectina por kg de peso vivo; equivalente a 0,1 ml del medicamento veterinario por 10 kg de peso vivo. En caprino, el volumen por punto de inyección no debe exceder los 0,6 ml. Viales de 50 ml y 100 ml No exceder las 30 punciones por vial. Si se requieren más de 30 punciones, se recomienda el uso de una aguja de extracción. Viales de 250 ml y 500 ml No exceder las 20 punciones por vial. Si se requieren más de 20 punciones, se recomienda el uso de una aguja de extracción. Para asegurar la administración de una dosis correcta, el peso vivo se debe determinar con la mayor exactitud posible y se deberá medir la precisión del dispositivo de dosificación. **Sobredosificación: Bovino, ovino:** No se han observado efectos adversos tras la administración subcutánea de hasta 5 veces la dosis recomendada, salvo una reacción transitoria (inflamación seguida de endurecimiento) en el punto de inyección. **Tiempo de espera: Bovino:** Carne: 63 días. Leche: cero horas. **Ovino:** Carne: 42 días. Leche: cero horas Caprino: Carne: 42 días. Leche: cero horas. **TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN:** CEVA Salud Animal, S.A. Avda. Diagonal 609-615 08028 Barcelona España. N° de registro: 3255 ESP. Medicamento sujeto a prescripción veterinaria.

9-RU-PA-20-437